CATALOGUE

DES

PLANTES VASCULAIRES

QUI CROISSENT NATURELLEMENT

DANS LE CANTON DE MONDOUBLEAU

PAR

L. LEGUÉ

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE

PARIS
LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES
PAUL KLINCKSIECK
52, rue des Écoles, 52

CATALOGUE

DES

PLANTES VASCULAIRES

QUI CROISSENT DANS LE

CANTON DE MONDOUBLEAU

CATALOGUE

DES

PLANTES VASCULAIRES

QUI CROISSENT NATURELLEMENT

DANS LE CANTON DE MONDOUBLEAU

PAR

L. LEGUÉ

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE

PARIS-AUTEUIL
IMPRIMERIE DES APPRENTIS-ORPHELINS — ROUSSEL
40, rue La Fontaine, 40.

1891

A mon ami Ernest Nouel,

Professeur de Physique au Lycée de Vendôme.

AVANT-PROPOS

Le canton de Mondoubleau presque tout entier est recouvert d'une couche d'argile à silex masquée çà et là par le limon des plateaux; seule, une bande assez étroite de sables du Perche, appartenant à l'étage cénomanien, s'étend de Cormenon à Sargé et se prolonge ensuite dans le canton voisin de Savigny-sur-Braye. Aussi les plantes décidément calcicoles observées dans l'arrondissement de Vendôme, à l'est et au sud du Loir *(Helianthemum pulverulentum* D. C., *Polygala calcarea* Schultz, *Ononis Columnæ* All., *Coronilla minima* L., *Carduncellus mitissimus* DC., etc.), nous manquent-elles absolument. Quelques espèces moins avides de calcaire, plus indifférentes à la nature chimique du sol, telles que *Helleborus fœtidus* L., *Malva Alcea* L., *Genista sagittalis* L., *Trifolium medium* L., *Tussilago Farfara* L., *Filago spathulata* Presl., *Lithospermum officinale* L., indiquent chez nous, soit les points où le calcaire est mélangé à l'argile, soit ceux où viennent affleurer les marnes turoniennes, presque partout recouvertes par cette même argile.

Le *Catalogue raisonné des plantes qui croissent naturellement à Saint-Calais et dans ses environs,* rédigé par un excellent botaniste, Diard, énumère 946 espèces de plantes vasculaires; il comprend

trente-cinq communes où la nature des terrains est assez variée. J'ai observé dans les quatorze communes du canton de Mondoubleau 786 espèces légitimes et 17 hybrides plus ou moins certains. Il eût été facile, en multipliant les espèces, de grossir leur chiffre ; si, dans plusieurs cas, j'ai réuni sous un même nom des formes que d'autres ont séparées, c'est qu'il m'a semblé que j'étais ainsi plus près de la réalité des choses. Je ne pense pas que l'on puisse me reprocher cette manière de voir : Boreau fut un maître renommé qu'il est permis de suivre, mais l'on peut aussi prendre exemple sur des botanistes tels que Cosson et Germain. Et, pour tout dire, je crois que, dans cette difficile et peut-être insoluble question de l'espèce, beaucoup d'auteurs ont fait comme moi, ils ont suivi les tendances, les préjugés, si l'on veut, de leur esprit, plutôt qu'ils n'ont obéi à une conviction raisonnée et arrêtée.

Lorsqu'une espèce s'est présentée à moi sous plusieurs formes méritant d'être distinguées, je n'ai point cru devoir considérer l'une de ces formes comme l'espèce véritable et les autres comme des variétés. Sur quelle base établir ces appréciations différentes ? Pourquoi traiter diversement les variétés ? « Ne sont-elles pas toutes des éléments du groupe supérieur appelé espèce ? (1) » Si l'on admet que le *Cardamine hirsuta* L. et le *Cardamine silvatica* Link sont deux aspects d'un même type, pourquoi le premier seul constituerait-il l'espèce, tandis que le second n'obtiendrait que le rang inférieur de variété ? Je n'en vois pas la raison et j'ai trouvé plus vrai d'énumérer les différentes formes d'un groupe spécifique en leur accordant à toutes une valeur égale.

(1) Alph. de Candolle, *Phytographie*, p. 77.

Plusieurs botanistes ont contribué à l'achèvement de ce catalogue ; je me fais un plaisir d'adresser, à ceux de mes collaborateurs qui peuvent les entendre, les remerciements que je leur dois. J'ai pu retrouver quelques-unes des plantes rares que le catalogue de Diard indique autour de Sargé, quatre ou cinq d'entre elles ont cependant échappé à mes recherches. Emile Desvaux, dont la botanique n'oubliera point le nom, herborisait dans le Perche vers 1850 (sa famille habitait Mondoubleau) ; je me suis servi des notes et des indications qu'il a laissées. Madame de Terras a bien voulu me communiquer le résultat de ses herborisations autour du Grand-Bouchet ; j'ai vu ses récoltes et je me suis demandé s'il restait quelque chose à glaner dans le coin du Perche qu'elle a si soigneusement exploré, où elle a découvert, pour ne citer que cela, l'*Erica scoparia* et le *Potamogeton trichoides*. M. l'abbé Segret, jeune botaniste de passage dans notre canton, Auguste Pilon, jardinier au château de Baillou, qui fut pendant de trop courtes années mon compagnon d'étude, m'ont encore fourni d'utiles renseignements. Je ne saurais terminer cette revue des ouvrages et des personnes à qui mon catalogue doit quelque chose sans parler de M. Franchet dont les avis m'ont toujours été précieux, et sans recommander aux botanistes de notre région sa *Flore de Loir-et-Cher,* œuvre d'un maître expérimenté dans l'art de connaître et de décrire les plantes.

L'opuscule que je recommande à la bienveillance du lecteur, ne peut évidemment intéresser qu'un public très restreint ; j'ai voulu quand même, après trente années de recherches, donner un tableau, aussi exact que je le pouvais faire, de la végétation du canton de Mondoubleau, et surtout laisser un

guide, que je me suis efforcé de rendre sûr, aux botanistes qui herboriseront dans le Perche quand je n'y serai plus. Je souhaite qu'ils aient à retrouver nos plantes rares autant de plaisir que j'en ai eu moi-même à les découvrir. Et puis il m'a semblé que j'acquittais ainsi une sorte de dette contractée envers la botanique. Je serais vraiment ingrat si je ne lui étais pas reconnaissant. Elle m'a procuré des heures bien remplies, — je ne lui demandais pas autre chose — et d'agréables relations dont le charme ne s'est point démenti ; enfin, je lui dois des amis fidèles et dévoués, au premier rang desquels se place le botaniste distingué dont je viens d'écrire le nom en tête de ces pages.

Mondoubleau, le 15 Février 1891.

CATALOGUE

DES

PLANTES VASCULAIRES

QUI CROISSENT NATURELLEMENT

DANS LE CANTON DE MONDOUBLEAU

RENONCULACÉES

Clematis Vitalba L. — Haies, broussailles. C.

Thalictrum flavum L. — Bords des rivières, des ruisseaux.

a. *flavum* (*Th. flavum* L. Gr. God.) R.
Val de la Graine à Mondoubleau et au dessous de Cormenon. — Baillou, bords de la Braye. — Sargé, val de la Braye (Diard).

b. *angustifolium* Gr. God. (Feuilles étroites, anthères apiculées : *Th. nigricans* Jacq. Vérifié par M. Boreau.) RR.
Baillou, bords de la Braye au-dessus du pont.

Anemone nemorosa L. — Lieux frais ; prés, bois. AR.
Cormenon ; bords de la Graine, du ruisseau du Parc et du ruisseau de la Tuilerie. — Choue ; bords du ruisseau de Romeau, bois au dessous de la Petite-Barre, bois d'Assise. — Sargé ; parc du Fief-Corbin, bords du ruisseau du Marais. — Val du Coitron où je l'ai observé à fleurs d'un bleu lilas.

Myosurus minimus L. — Terrains siliceux et humides. R.
Choue, champs au-dessous de la Fosse. — Baillou, champs autour de la Grande-Ouvernière (Pilon). — Sargé ; près et au-dessous du bourg, à l'entrée d'un pré sur la rive gauche de la Braye. — Souday (Em. Desvaux), où je ne l'ai pas rencontré.

Ranunculus hederaceus L. — Lieux fangeux; fossés, bords des mares. R.

Cormenon, mare au-dessous de la Maillardière. — Choue, bords de la Graine auprès et au-dessous du moulin de Monvalet, cour du moulin des Gauts. — Sargé; près et au-dessous du bourg, dans un chemin qui conduit à la prairie; bords d'une mare située au-dessous de la route de Mondoubleau et près de la borne 42; fossés à la Crousille. — Fossés du chemin de St-Agil à la Fontenelle.

Ranunculus aquatilis L. — Eaux stagnantes. C.

On trouve la forme terrestre dans les lieux asséchés. R.

Ranunculus tricophyllus Chaix. — Eaux tranquilles. RR.

Baillou, ruisseau de Petite-Eau (1866, disparu). — Sargé; non loin de la gare, fossés d'un chemin qui conduit dans la prairie.

Ranunculus divaricatus Schrank. — Ruisseaux, rivières, étangs. AR.

Dans la Graine et dans la Braye. — Étang de Bois-Vinet (feuilles à segments très allongés).

Ranunculus fluitans Lam. — Rivières. R.

Dans la Braye.

Ranunculus Flammula L. — Lieux humides, fossés. C.

Le docteur Rendu a toujours vu dans une mare aux Grandes-Berruères (Choue) le *Ranunculus Lingua* L. et le *Limnanthemum nymphoïdes* Link; je pense, malgré cela, qu'ils ont été plantés par M. Rendu, père du propriétaire actuel et botaniste distingué.

Ranunculus auricomus L. — Lieux frais; prés, bois. C.

Ranunculus acris L. — Prés, gazons. CC.

Ranunculus silvaticus Thuill. — Bois, lieux ombragés. AR.

Baillou, bois de la Talbotière. — Choue; bois de la Bellotière, bois du Grand-Bouchet (Mme de Terras).— Souday, bois des Joncs. — Forêt de Montmirail.

Ranunculus repens L. — Près, gazons, jardins. CC.

Les tiges sont quelquefois dressées et non radicantes.

Ranunculus bulbosus L. — Prés secs, chaintres. CC.

Ranunculus chærophyllos L. — Bords des chemins, des haies, dans les terrains siliceux. R.

Cormenon, chemin des Rouaudières à la Challerie. — Baillou, bords du chemin de Valennes près de Frécul. — Choue, talus du chemin des Souches au Grand-Bouchet (Mme de Terras).

Ranunculus sardous Crantz. — (*R. philonotis* Ehrh.) Champs. AR.

Cormenon, moissons autour des Rouaudières où je l'ai observé à fleurs doubles. — Choue. — Baillou, autour du bourg (Pilon). — Souday ; autour du Patouia ; moissons à Tertre-Rouge, à la Ramée. — St-Avit.

Ranunculus parviflorus L. — Bords des haies, des chemins, dans les terrains sablonneux. R.

Cormenon, au dessous de la Maillardière. — Choue, talus du chemin de la Chapelle-Vicomtesse. — Baillou ; bords du chemin de Sargé et du chemin de Valenes, près du bourg.

Ranunculus ophioglossifolius Vill. — Lieux très humides, flaques d'eau. RR.

Sargé ; près et au-dessous du bourg, à l'entrée d'un pré situé sur la rive gauche de la Braye. — Fossés de la prairie entre Baillou et Sargé, en face du moulin de Villejus.

Ranunculus arvensis L. — Moissons. C.

Ranunculus sceleratus L. — Lieux fangeux. R.

Près du bourg de Souday, fossés du chemin qui conduit au Plessis-Dorin. — Sargé, prés marécageux au dessous du bourg. — Rives de l'étang de Bois-Vinet.

Ficaria ranunculoides Mœnch. — Prés, bois. CC.

Pétales presque blancs : parc de Baillou, dans le voisinage de la Maison russe. Il y a réellement variation dans la couleur et non point seulement cette décoloration que subissent les fleurs passées du *Fic. Ranunculoides*.

Caltha palustris L. — Lieux humides ; bords des ruisseaux, des rivières. CC.

Je l'ai trouvé : à Mondoubleau, dans le Pré-Barré, à fleurs semi-doubles ; à Cormenon, près de l'étang des Rouaudières, à feuilles et à fleurs moitié plus petites que dans la forme habituelle.

Helleborus fœtidus L. — Bords des chemins, haies. AC.

Mondoubleau, ravin au sud-ouest du Tertre. — Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou. Etc.

Isopyrum thalictroides L. — Lieux pierreux et ombragés. RR.
Bords du ruisseau du Parc au-dessus de Cormenon (à la hauteur de la Borde-des-Tailles, en face de la Borde-Solier. Etc).

Aquilegia vulgaris L. — Lieux ombragés. AC. — Val du ruisseau du Parc, non loin de Mondoubleau. — Bois de Baillou. — Choue, bois de Guériteau. Etc.

BERBÉRIDÉES

Berberis vulgaris L. — Haies, buissons voisins des habitations. Naturalisé. R.
Mondoubleau, au pied de la vieille tour où il peut être un reste de cultures très anciennes. — Baillou, haies du parc.

NYMPHÉACÉES

Nymphæa alba L. — Eaux tranquilles. AR.
Fosse de la Bonde, près de Mondoubleau. — Cormenon, étang des Rouaudières. — Sargé, ruisseau dans le parc du Fief-Corbin. — St-Avit, étang de la Grande-Thiéraie. — Dans la Braye.

Nuphar luteum Sm. — Rivières, ruisseaux, fossés. AC.
Dans la Graine, dans la Braye. Etc.

PAPAVÉRACÉES

Papaver Rhœas L. — Moissons. CC.

Papaver dubium L. — Moissons. R.
Baillou, sablière (Pilon). — Cormenon, moissons aux Rouaudières.

Papaver Argemone L. — Moissons des terrains sablonneux. R.
Cormenon, autour des Rouaudières.

Chelidonium majus L. — Jardins, murs. CC.

FUMARIACÉES

Fumaria capreolata L. — Jardins. AR.
Mondoubleau. — Choue. — Baillou. — Sargé.

Fumaria Bastardi Bor. — Jardins. AR.
Mondoubleau. — Cormenon. — St-Mars-du-Cor (Abbé Segret) — Baillou.
Les premières fleurs sont quelquefois d'un rose vineux assez foncé.
Le *Fum. Wirtgeni* Koch, qui me semble très voisin du *Bastardi*, croît dans le parc de Baillou (Pilon).

Fumaria officinalis L. — Jardins. CC.
Pétioles tortiles, fleurs pâles : *F. media* Lois. Mondoubleau.

CRUCIFÈRES

Raphanus Raphanistrum L. — Champs. CC.

Sinapis arvensis L. — Champs, moissons, CC.
Les siliques sont étalées ou dressées, glabres ou hérissées. On cultive rarement le *Sin. alba* L. On rencontre quelquefois dans les champs le *Brassica Napus* L.

Sinapis Cheiranthus Koch. — Terrains sablonneux. R.
Sargé, autour des Brosses et près de Montmarin.

Cheiranthus Cheiri L. — Vieux murs. R.
Mondoubleau, murs de la vieille ville. — St-Avit, murs du vieux château de la Grande-Thiéraie.

Barbarea vulgaris Rob. Br. — Lieux frais ou humides. AC.

Sisymbrium officinale Scop. — Lieux vagues, bords des chemins, décombres. C.

Sisymbrium Alliaria Scop. — Lieux frais, ombragés. C.

Nasturtium officinale Rob. Br. — Eaux vives. AC.

Nasturtium palustre DC. — Lieux humides. R.
— Près de Mondoubleau, abreuvoir de la ferme de la Bonde. — Vieux chemin de Cormenon au Gravier. — Baillou, bords

de la Braye et du ruisseau de Petite-Eau (Pilon). — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Nasturtium amphibium Rob. Br. — Eaux tranquilles. R.
Baillou, prairie de Villejus. — Sargé ; étang des Brosses, mare dans les prés situés au-dessous de la ferme des Pâtis. — Étang de Bois-Vinet.

Arabis Thaliana L.— Bords des haies, jachères, murs. CC.

Cardamine pratensis L. — Lieux frais ; prés, bois. CC.
Varie à fleurs blanches.
Diard a observé l'anomalie à fleurs doubles (*var. luxurians* cat. St-Cal.) à Sargé, dans les prés vis-à-vis de Montmarin. Je la possède en herbier de cette localité.

Cardamine amara L. — Prés humides, bords des eaux vives AC.
C. Dans le val de la Graine et dans le val de la Braye. — Souday, val du Coitron. Etc.
Anomalie : pétales verts et concaves. Mondoubleau.

Cardamine impatiens L. — Lieux frais, bords des eaux vives. R.
Choue, bords de la Graine au dessous du moulin de Monvalet.. — St-Mars-du-Cor, petit bois situé au nord-ouest des Châtaigniers (Abbé Segret).— Baillou, bords de la Braye (Pilon). — Sargé, bords de la Graine au-dessous du Gravier.

Cardamine hirsuta L. — Lieux frais, bords des eaux vives.
a. *hirsuta* (*C. hirsuta* L. Gr. God.) RR.
Choue, bords de la Graine entre le moulin de Monvalet et le Moulin-Neuf.
b. *silvatica* (*C. Silvatica* Link. Gr. God.) R.
Bords de la Graine ; particulièrement dans le Pré-Barré et à la fosse de la Bonde (près de Mondoubleau), entre le moulin de Monvalet et le Moulin-Neuf (Choue), et au dessous de Cormenon. — Choue, bois de Guériteau.

Alyssum calycinum L. — Terrains sablonneux. RR.
Sargé, sablière près de Montmarin.

Draba verna L. — Lieux vagues, bords des chemins, allées des jardins, murs. CC.

Teesdalia nudicaulis Rob. Br.— Terrains sablonneux. R.

Cormenon, sables des Rouaudières. — Sargé, autour des Brosses.

Le 2 mai 1880, j'ai vainement cherché le *T. nudicaulis* dans les sables des Rouaudières où il est habituellement C. Les *Spergula pentandra* L. et *Morisonii* Bor. y faisaient de même à peu près complètement défaut. La disparition momentanée de ces trois espèces était due sans doute à l'hiver rigoureux subi en 1879-1880.

On observe rarement dans les jardins et dans les champs (Cormenon, autour des Rouaudières; Baillou, champs du parc. Pilon), le *Thlaspi arvense* L. assez commun en Sologne et aux environs de Blois. Il n'a point de fixité dans ses stations et je ne le considére pas comme appartenant à la flore du canton de Mondoubleau.

Capsella bursa-pastoris Mœnch. — Lieux cultivés, bords des chemins. CC.

Lepidium campestre Rob. Br. — Jachères; bords des chemins, des haies. C.

J'ai indiqué autrefois, et à tort, le *Lep. heterophyllum* Benth. var. *canescens* Gr. God. (*Lep. Smithii.* Hook) près de Mondoubleau, dans la partie sèche des prés du Foulon. Sa présence y était purement accidentelle, comme dans certains gazons du parc de Baillou où Pilon l'avait observé, et il n'a point persisté.

Lepidium latifolium L. — Voisinage des jardins, fumiers. R.

Baillou, à la Javardière. — Beauchêne; au Coudray, le long de la haie du jardin. — Diard, cat. St-Cal., l'indique à Sargé, dans une haie du jardin de Beauvais.

Le voisinage des habitations rend très douteuse la spontanéité de cette plante, je la considère comme seulement naturalisée dans notre canton.

Lepidium Draba L. — Bords des chemins. RR.

Complétement naturalisé et abondant à Baillou sur le bord du chemin de Mondoubleau, près de l'orangerie du château, et sur le bord du chemin de Rahay, près de la maison d'école. Paru en 1868, on ne sait d'où il est venu.

Senebiera Coronopus Poir.— Cours,décombres,chemins R.

Mondoubleau, près de la vieille tour et cour de la ferme de la Bonde. — Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou près des Jeux-Couverts.—Vieux chemin de Cormenon au Gravier. — Baillou (Pilon).

CISTINÉES

Helianthemun guttatum Mill. — Lieux sablonneux R. — Sargé; bois des Galouries, parc du château du Fief-Corbin.

VIOLARIÉES

Viola hirta L. — Prés, bois haies. CC.
Varie à fleurs entièrement blanches (Baillou, trouvé une seule fois) et à fleurs dont l'éperon seulement est blanc (Mondoubleau, Pré-Barré).

Viola permixta Jord. — Prés, bois. R.
Baillou; parc, au nord-est du château (Pilon). — St-Mars-du-Cor, près de la Bigotière.—Sargé, bois des Galouries.
J'ai pu constater, à Baillou et à Sargé, que les capsules de cette plante avortent presque toujours; serait-elle un hybride des *V. hirta* et *odorata?* Elle me paraît en tout cas bien voisine du *V. abortiva* Jord. que M. Franchet, fl. L. et Ch., 64, indique à Cheverny et qu'il dit « exactement intermédiaire entre le *V. hirta* et le *V. odorata.* » Je n'oserais pas affirmer que l'on ne peut rapporter au *V. abortiva* la plante que j'ai nommée *V. permixta* ; il est permis d'hésiter et souvent difficile de choisir entre deux espèces de M. Jordan.

Viola odorata L. — Lieux frais; prés, bois, chaintres. C C.
Varie souvent à fleurs pâles ou blanches.

Viola silvatica Fr.
a. *Reichenbachiana* (*V. Reichenbachiana* Jord.) — Lieux frais; prés, bois. AC.
Val de la Graine. — Val du ruisseau du Parc. Etc. — Je l'ai observé au pont d'Oisnel, près de Mondoubleau, à fleurs lilas pâle; l'éperon était jaunâtre comme dans *Riviniana.*
b. *Riviniana* (*V. Riviniana* Reich.) — Lieux ombragés, bois, haies. C C.
Plante émettant des stolons! Baillou, bois de Roclane. Forme remarquable.
Fleurs entièrement blanches: trouvé une seule fois dans les bois de Baillou (Pilon). Fleurs à trois éperons: Corme-

non, bords du ruisseau du Parc. — Les fleurs ordinairement d'un beau violet, quelquefois d'un lilas clair, ont l'éperon jaunâtre ou simplement plus pâle que les pétales, le plus souvent canaliculé.

J'ai récolté à Beauchêne, dans les bois des Grands-Marchais, un *Viola* que je considérerais volontiers comme hybride des *V. silvatica* et *canina* au milieu desquels il croît. Il se rapproche du premier par l'aspect général et par la forme des feuilles (un peu plus allongées cependant); du second, par l'absence de rosette centrale, les appendices des sépales souvent prononcés, l'éperon jaunâtre. Fleurs d'un bleu violet. Les capsules avortent au moins quelquefois.

Viola canina L. — Bruyères, haies. AR.

Haies auprès et au nord de Bellevue, près de Mondoubleau. — Cormenon, sables des Rouaudières. — Chemin de la Maladrie à la Grande-Ouvernière, sur la limite des communes de Baillou et de Sargé. — Vieux chemin de Mondoubleau à la Cour, sur la limite des communes de Baillou et de Souday. — Sargé; terrains sablonneux et buttes ferrugineuses au nord-est du bourg où Diard l'indique, cat. St-Cal. — Beauchêne, allées des bois des Grands-Marchais. — Forêt de Montmirail.

Je crois avec M. Franchet, fl. L.-et-Ch. p. 66, et contrairement à l'opinion de Boreau, fl. centr. ed. III n° 290, que la plante de Sargé appartient au *V. canina*. Elle offre à la vérité des formes intermédiaires qui tendent au *V. lancifolia*, mais aucune de ces formes n'est suffisamment caractérisée pour qu'on la rapporte à l'espèce de Thore.

Viola tricolor L. — Champs. CC.

RÉSÉDACÉES

Réséda luteola L. — Jachères, lieux incultes, murs CC.

DROSÉRACÉES

Drosera rotundifolia L. — Lieux marécageux. R.

Prés marécageux au-dessous et à l'ouest de la Maillardière, sur la limite des communes de Cormenon et de Sargé. — Choue; pré du Charbon, au-dessous de la Combrayse. — Sargé;

étang de la Crousille (Em. Desvaux, note manuscrite trouvée dans l'herbier Monin, au musée de Blois. L'étang de la Crousille a été desséché.) — Souday, bois de Glatigny. — St-Avit, bruyère des Maisons.

Parnassia palustris L. — Prés tourbeux. AC.
Val de la Graine au-dessus de Mondoubleau, principalement entre le Moulin-Neuf et le moulin de Monvalet. — Val du ruisseau du Parc. — St-Avit, autour de la Grande-Thiéraie. Etc.

POLYGALÉES

Polygala vulgaris L. — Gazons, prés secs. CC.
Varie à fleurs blanches, à fleurs roses et, beaucoup plus rarement, à fleurs blanches mêlées de bleu.

Polygala depressa Wend. — Bois, broussailles. AR.
Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou. — Cormenon, bruyères aux Rouaudières. — Choue; bois du Grand-Bouchet (Mme de Terras,) bois d'Assise. — Sargé, bois des Galouries. — Grands Bois de St-Agil, où il varie à fleurs roses. — Forêt de Montmirail.

CARYOPHYLLÉES

Cucubalus bacciferus L. — Bois, haies. AR.
Haies en face de l'Alliance, sur le bord du vieux chemin de Mondoubleau au Gravier. — AC. à Baillou ; haies du parc, du bois de Roclane, etc. (Pilon). — Sargé, près de Montmarin.

Silene inflata Sm. — Champs.
a. *inflata* (*S. Cucubalus* Wib. var *glabrata* Franch.). CC.
b. *puberula* (*S. puberula* Jord. Bor.) AC.

Silene conica L. — Terrains sablonneux. RR.
Cormenon, autour d'une ancienne sablière près et au sud-ouest de la Maillardière.

Silena gallica L. — Moissons des terrains sablonneux. R.
Cormenon, autour des Rouaudières. — Baillou, moissons aux Chauffetières (Pilon). — Sargé, sablière près de Montmarin.

Lychnis dioica L. — Bois, murs. C.

Lychnis flos cuculi L. — Prés humides. CC.
Varie rarement à fleurs blanches.

Lychnis Githago Lam. — Moissons. CC.
Varie à fleurs blanches.
On observe très rarement dans les moissons le *Saponaria Vaccaria* L. qui n'appartient pas à notre flore.

Gypsophila muralis L. — Champs et bois humides. R.
Choue ; au bas du bois de Romeau (près de la fontaine de l'Epinay,) allées des bois de la Péchardière. — Baillou, champs sablonneux autour de la Croix-Bourbon (Pilon). — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Dianthus prolifer L. Terrains sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières.

Dianthus Armeria L. — Jachères, lieux incultes. AC.

Sagina procumbens L. — Bords des chemins ; entre les pavés des rues, des cours. C.

Sagina apetala L.
a. *apetala* (*S. apetala* L. Gr. God.) — Bords des chemins, champs, C.
Pédoncules pubescents-glanduleux ou glabres.
b. *ciliata* (*S. ciliata* Fr. Gr. God. *S. patula* Jord.) — Lieux sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou, champs au bord de la Braye : feuilles plus ou moins ciliées à la base. Les spécimens récoltés dans le Loir-et-Cher et qu'a pu voir M. Franchet, avaient tous des feuilles complétement glabres.
Le *S. filicaulis* Jord. (sépales obtus comme dans *apetala* appliqués sur la capsule comme dans *ciliata*) et le *S. ambigua* Lloyd (sépales ouverts, non étalés à la maturité du fruit) me semblent établir le passage entre le *S. apetala* L. et le *S. ciliata* Fr.

Alsine tenuifolia Crantz. — Lieux secs, murs. R.
Mondoubleau, murs dans le voisinage de l'ancienne prison. — Cormenon, sables des Rouaudières. — Choue, carrière abandonnée au-dessous de la Raluère. — Murs de l'ancien cimetière de Baillou.

Arenaria trinervia L. — Haies fraîches, lieux ombragés. C.

Arenaria serpillifolia L. — Moissons, murs. C.
Je n'ai observé dans le canton de Mondoubleau que la forme décrite par Gussone sous le nom d'*Ar. leptoclados*.

Stellaria media Vill. — Jardins, décombres, murs.
a. *neglecta* (*St. neglecta* Weihe. Bor. *St. media* var. *major* Koch.) — Mondoubleau.
b. *media* (*St. media.* Vill. Bor.) CC.
c. *Borœana* (*St. Borœna* Jord. Bor.). — Baillou.

Stellaria Holostea L. — Bords des haies, broussailles. CC.

Stellaria graminea L. — Bords des haies, broussailles. C.

Stellaria uliginosa Murr. — Lieux marécageux, fossés. AR.
Fossés de la route de Mondoubleau à Sargé au dessous des Pâtis et prés humides dans le voisinage de la même route. — Cormenon, autour du Petit-Gaulay. — St-Mars-du-Cor, petit bois situé au nord-ouest des Chataigniers (Abbé Segret). — Sargé, prés à la Crousille. — Bords du ruisseau du Marais, sur la limite des communes de Sargé et de Savigny. — Souday, bois d'aunes sur le bord du Coitron (au dessus du moulin de Chalopin) et bois des Joncs près de Tertre-Rouge. — Oigny, val du Coitron vers la Pilardière. — Environs du Plessis-Dorin.
Diard, cat. St-Cal., ne mentionne pas cette plante qui semble rare autour du canton de Mondoubleau.

Mœnchia erecta Gærtn. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou, à la Croix-Bourbon. — Allées de la forêt de Montmirail.

Cerastium viscosum L. (*C. glomeratum* Thuill.) — Bords des chemins, des haies ; prés secs. CC.
On le trouve avec des tiges glanduleuses visqueuses au sommet. Boreau dit cette forme rare. — Les pétales manquent quelquefois.

Cerastium brachypetalum Desp. — Terrains sablonneux RR.
Cormenon, au Four-à-chaux. — Baillou, potager du château (Pilon).
Pétales ciliées à l'onglet et non glabres comme le disent Gr. God. fl. fr. et Franch. fl. L.-et-Ch. — Bor. fl. centr. ed. III, n° 422, décrit bien cette espèce.

Cerastium semidecandrum L. — Terrains sablonneux. R.
Mondoubleau, (Em. Desvaux). — Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou, sablière du Pont-du-Bas (Pilon). — Sargé, près de Montmarin.

Cerastium pumilum Curt. (*C. glutinosum*. Fr.) — Sables RR.
Cormenon, au Four-à-chaux. — Choue, carrière abandonnée au-dessous de la Raluère.

Cerastium vulgatum L. (*C. triviale* Link.) Prés, gazons murs. CC.
« La largeur de la marge scarieuse des bractées est très variable et dépasse quelquefois celle de la partie verte comme chez le *C. semidecandrum*; M. Legué m'a envoyé cette forme récoltée aux environs de Mondoubleau. » Franch. fl. L.-et-Ch.

Malachium aquaticum Fr. — Bords des eaux vives. AC.
Mondoubleau; à la Bonde, bords du ruisseau. Etc.

Spergula arvensis L. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, moissons autour des Rouaudières. — Choue; au Grand-Bouchet, allées sablonneuses du parc. — Beauchêne, moissons aux Turnes. — Chemin de Sargé au Temple. — Forêt de Montmirail.
La forme que j'ai observée est le *Sp. vulgaris* Boenng. Bor. fl. centr. ed. III. nº 386.

Spergula pentandra L. — Terrains sablonneux. RR.
Cormenon, sables des Rouaudières.

Spergula Morisonii Bor. — Terrains sablonneux. RR.
Cormenon; sables des Rouaudières, à l'est du château et près du chemin qui conduit au Four-à-Chaux. Découvert par le regretté Em. Desvaux.

Spergularia segetalis Fenzl. — Champs sablonneux. R.
Cormenon, moissons aux Rouaudières. — Choue, autour du Grand-Bouchet (Mme de Terras). — St-Avit, moissons à la Grande-Thiéraie.

Spergularia rubra Pers. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Sargé, butte de la Meute. — Bords de l'étang de Bois-Vinet. — Forêt de Montmirail.

ÉLATINÉES.

Elatine hexandra L. — Bords des étangs. RR.
Petit étang de Bois-Vinet, près de la Bonde. Très petits individus. Les fleurs, sessiles, ont 3 sépales, 3 pétales, 3 étamines.

LINÉES.

Linum gallicum L. — Bords des chemins, champs. AC.
Chemin près et à l'ouest de Bellevue et champs autour de Montluisard, près de Mondoubleau. — Chemin vert allant de la Maladrie aux Gandonnières près de Cormenon. — Champs et chemins verts autour de Rocheux, de la Ferpinière, de la Fosse, sur la limite des communes de Mondoubleau et de Choue. Etc.

Linum catharticum L. — Bords des champs, des chemins ; prés. CC.

Radiola linoides Gmel. — Lieux sablonneux et humides. AR.
Bords du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Broussailles sur le bord du chemin de Mondoubleau à Baillou, à la hauteur de la borne 2. — Choue ; champ des Mulots à la ferme du Débarras. — Beauchêne : au Pavillon, fossés de la ruelle. — Allées des Grands bois de Saint-Agil. — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

TILIACÉES.

Tilia silvestris Desf. — Bois. RR.
Bois de la Maladrie, près de Mondoubleau.

MALVACÉES.

Malva Alcea L. — Bords des chemins, des haies RR.
Bords de la route de Sargé à Savigny-sur-Braye, entre Montmarin et le moulin du Marais.

Malva moschata L. — Lieux secs ; prés, broussailles. AC. On rencontre quelquefois la var. *laciniata* (*M. laciniata* Desr. in Lam. Bor).

Malva silvestris L. — Lieux vagues, décombres. C.

Malva rotundifolia L. — Lieux vagues, bords des champs et des chemins. CC.

Althæa officinalis L. — Bords des eaux. RR.
Baillou, bords de la Braye. — Bords de la Graine, près de Mondoubleau où il peut être échappé des jardins.

Althæa hirsuta L. — Terrains sablonneux. RR.
Baillou, sablière du Pont-du-Bas.

GÉRANIÉES

Geranium columbinum L. — Lieux vagues, bords des haies. C.
Varie très rarement à fleurs blanches.
J'ai observé le *Ger. pyrenaicum*, plante du sud-ouest de la France, au bas du jardin de la Borde-Solier (Cormenon) d'où il a gagné le pré voisin, et M. l'Abbé Segret me l'a signalé autour de l'église du Plessis-Dorin.

Geranium molle L. — Lieux vagues. C.

Geranium pusillum L. — Lieux vagues. RR.
Le Temple, autour de l'église.

Geranium rotundifolium L. — Lieux incultes, haies, murs. C.
Je l'ai observé avec les filets des étamines ciliés. Gr. God. fl. fr., Franch. fl. L.-et-Ch., disent que les étamines sont glabres.

Geranium Robertianum L. — Lieux ombragés ; bois, haies, murs. CC.
Fleurs blanches ; St-Agil, haies du chemin de la Fontenelle.
Diard, cat. St-Cal., indique à Sargé, terrains sablonneux autour du Fief-Corbin, la var. *parviflorum* Viv. (*Ger. purpureum* Vill).

Erodium cicutarium L'Hérit. — Lieux secs et incultes, murs.
a. *pimpinellæfolium* DC. fl. fr. CC.
b. *pilosum* DC. fl. fr. (*Ger. pilosum* Thuill). — Cormenon, sables des Rouaudières.
La var. *præcox* DC. (tige nulle, fleurit au printemps) ne représente, comme le dit M. Franchet, fl. L.-et-Ch., que l'état de la plante incomplétement développée.

HYPÉRICINÉES.

Hypericum perforatum L. — Lieux incultes, jachères, bois. CC.

Hypericum quadrangulum L. — Lieux frais ; bords des eaux, bois, haies. AC.
Bords de la fosse de la Bonde, près de Mondoubleau. — Val du ruisseau du Parc au-dessus de Cormenon. — Baillou, bois de Roclane et de la Talbotière. Etc.

Hypericum humifusum L. — Lieux secs, talus des haies. AC.
C'est à tort que Boreau, fl. centr. éd. III, attribue sans exception à cette espèce des tiges couchées et des sépales obtus, entiers, non ciliés. L'*Hypericum humifusum* offre souvent des tiges ascendantes ou dressées et, particulièrement chez les individus robustes, des sépales dentés glanduleux, parfois aigus, comme dans l'*Hypericum linarifolium* Vahl.

Hypericum pulchrum L. — Bois. AC.
Baillou, bois de la Talbotière. — Choue, bois de Guériteau. Etc.

Hypericum hirsutum L. — Bois. AC.

Hypericum montanum L. — Haies, brousailles. RR.
Près de Mondoubleau ; haies à droite de la route qui conduit à St-Agil, vis-à-vis le bois du Tertre.

Hypericum Androsæmum L. — Bois frais. R.
Souday ; au bas du bois des Joncs, bois des Bouleaux. — Le Plessis-Dorin, bois situé au bord et à gauche du chemin qui conduit à la Verrerie (assez abondant autour de l'endroit où l'on a tiré de la terre) et chemin de la Verrerie à l'Etoile. — M. Moreau, pharmacien à Blois, l'a vu entre Sargé et Savigny-sur-Braye.

ACÉRINÉES

Acer campestre L. — Haies, bois. C.

OXALIDÉES

Oxalis Acetosella L. — Lieux frais et couverts. R.
Bords du ruisseau du Parc, au-dessus de Cormenon, où je l'ai trouvé sur l'indication d'Em. Desvaux.— Choue ; fontaine au-dessous des Veauxlions et près du bois de Guériteau ; bois de la Péchardière, bords du ruisseau. — Souday, bois de Glatigny, au bord du ruisseau ; bois d'aunes et prés sur le bord du Coitron au-dessous du moulin de Chalopin ; bois des Joncs ; petit bois au-dessus et près du moulin de Marigny (Abbé Segret). — Forêt de Montmirail où il est assez abondant.

Oxalis stricta L. — Plante de l'Amérique du Nord naturalisée dans les jardins, les cultures. R.
Mondoubleau, jardins. — St-Mars-du-Cor, jardin des Grands-Marchais. — Choue ; au-dessous de la Petite-Pilonnière, dans le lit desséché du ruisseau, et vallon entre le Fourneau et la Martinière. — Baillou. — Beauchêne, jardins.

CÉLASTRINÉES.

Evonymus europæus L. — Haies, bois. AC.

ILICINÉES.

Ilex Aquifolium L. — Haies, buissons. C.

RHAMNÉES.

Rhamnus cathartica L. — Haies, bois. AR.
Près de Mondoubleau, au bas de la Levée. — Haies des chemins de Cormenon à Choue et au Temple.— Haies autour des

Gandonnières près de Cormenon. — Haies du vieux chemin de Mondoubleau au Gravier. — Cormenon, prés des Rouaudières. — Choue, AC.— Baillou, près du bois des Fourneaux (Pilon).

Rhamnus Frangula L. — Bois humides. AC.

PAPILIONACÉES.

Ulex europæus Sm. — Haies, bords des champs et des chemins. CC.

Ulex nanus Sm.— Lieux incultes, bords des chemins. AR. Baillou, à la croix du Boulay. — Choue. — Sargé ; chemins verts autour de la Crousille, au Fief-Corbin. — Souday; bords du chemin qui conduit de Glatigny à la Cour, C. autour de Tertre-Rouge. — Rives de l'étang de Bois-Vinet.

Sarothamnus vulgaris Wimmer. — Lieux secs et incultes, bords des champs. CC.

Genista sagittalis. L. — Lieux secs et incultes. R. Près de Mondoubleau : sur la Levée, ravin et champs proches et au sud-ouest de la ferme du Tertre. — Cormenon, au Four-à-Chaux — Environs de St-Mars-du-Cor. — Baillou, petit champ en face de Roclane.

Genista tinctoria L. — Lieux secs, bords des champs, des bois. C.

Genista anglica L. — Prés humides, lieux inondés l'hiver. AR.
Chemin qui de Bellevue, près de Mondoubleau, conduit au carrefour du Poirier.— Baillou, à la croix du Boulay.—Autour des Fosses, non loin de Cormenon. — Prés au-dessous de la Maillardière, sur la limite des communes de Cormenon et de Sargé ; bruyère près de l'étang des Brosses. — Rives de l'étang de Bois-Vinet.
Le *Cytisus Laburnum* L., planté dans le parc de Baillou, se retrouve non loin de là, dans le bois des Fourneaux. Haies de la Brousse, près de Cormenon.

Ononis repens L. — Lieux incultes, bords des chemins, champs, CC.
Varie rarement à fleurs blanches.

Medicago Lupulina L. — Bords des champs, des chemins, prés. — Souvent cultivé. CC.

Medicago sativa L. — Bords des champs, des prés. Cultivé. C.

Medicago polycarpa Willd. var. *apiculata* Gr. God. (*M. apiculata* Willd.) — Champs. RR.
Baillou ; dans un champ près et en face du château où nous l'avons observé, Pilon et moi, pendant plusieurs années. M. Franchet, fl. L.-et-Ch., le dit peu fixe dans ses stations.

Medicago maculata Willd. — Prés, gazons. R.
Prés autour de Mondoubleau. — Baillou ; bords du chemin de Mondoubleau, près du château.

Medicago minima Lam. — Sables. RR.
Cormenon, sables au-dessous et à l'ouest de la Maillardière.
On rencontre çà et là (prairies artificielles, bords des chemins, voisinage des gares) le *Melilotus officinalis* Lam. dont je ne connais pas de localité fixe et que je considère comme introduit dans le canton. Le *Mel. alba* Lam. croît sur les talus du chemin de fer entre Mondoubleau et Choue.

Trifolium medium L. — Bois, haies. R.
Près de Mondoubleau, dans le bois de la Maladrie et dans la Brousse. – Autour de la Tuilerie de Cormenon. — Haies du chemin de Mondoubleau à Baillou, à la borne 3. — Choue ; bords du bois de la Bellotière, bois du Grand-Bouchet. — Bois des Grands-Marchais, sur la limite des communes de St-Mars-du-Cor et de Beauchêne. — Dans un pré situé sur le bord du chemin de Mondoubleau à Souday. — St-Avit, autour de la Grande Thiéraie.

Trifolium pratense L. — Prés, pelouses, haies. Cultivé partout. CC.

Trifolium ochroleucum L. — Lieux secs et herbeux. AC.

Trifolium arvense L. — Terrains sablonneux ou pierreux. C.

Trifolium striatum L. — Lieux secs ; bords des champs, gazons. R.
Cormenon, autour des Rouaudières. — Sargé, dans un champ au nord des Virliblés.

Les observations de Diard semblent confirmer les miennes; il n'indique pas cette espèce qui serait alors tout à fait rare dans nos environs. Mais je crois apercevoir une erreur à la page 229 de son catalogue; il y donne le *Tr. scabrum* comme une plante commune; or le *Tr. scabrum*, rare dans la Sarthe et dans le Loir-et-Cher, n'a jamais été observé par M. l'abbé Bourmault, le zélé botaniste qui explore maintenant l'arrondissement de Saint-Calais. Il faut donc probablement lire, dans le catalogue de Diard, *Tr. striatum* au lieu de *Tr. scabrum*, la première de ces deux espèces étant en définitive plus répandue que la seconde autour de nous.

Trifolium fragiferum L. — Lieux frais, prés, bords des chemins. AC.

Trifolium glomeratum L. — Bords des champs, gazons RR.

Sargé: près des ponts (1869), belle localité aujourd'hui détruite; chemin qui de la route de Mondoubleau conduit au Pavillon.

Trifolium repens L. — Prés, gazons. CC.

J'ai vainement cherché le *Tr. elegans* Savi aux environs de la Pilonnière, près de Mondoubleau, où M. Franchet, fl. L.-et-Ch., l'indique d'après Em. Desvaux. Je possède des échantillons récoltés en Juin 1848 par celui-ci; leur étiquette ne porte que cette indication trop sommaire « La Pilonnière *prope* Mondoubleau. » Peut-être provenaient-ils d'une prairie artificielle? M. Franchet considère comme accidentelle dans notre département la présence des *Tr. elegans* Savi et *hybridum* L., plantes très voisines, la dernière quelquefois cultivée.

Trifolium filiforme L. (*Tr. micranthum* Viv.) Gazons AC.

Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou. — Chemins verts autour du Gravier. Etc.

Il n'est pas exact de dire, comme l'ont fait Grenier et Godron, Cosson et Germain, que chez le *Tr. filiforme* la foliole moyenne est toujours sessile. Les trois folioles sont brièvement et également pétiolulées, ainsi que l'ont très bien vu Boreau et M. Franchet.

Trifolium minus Relhan. — Lieux secs, gazons, champs CC.

Trifolium patens Schreb. — Prés frais. AR.

Val de la Graine. — Val de la Braye. — Prés au-dessus de la Tuilerie de Cormenon.

Trifolium procumbens L. — Champs, gazons. C.

Lotus corniculatus L. — Prés, gazons.
a. *corniculatus (L. corniculatus* L. Gr. God.) CC.
b. *tenuis (L. tenuis* Kit. Gr. God.) R.
Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou, près de la croix du Boulay. — Fossés du chemin de Mondoubleau à Souday.— Sargé, près de Montmarin.— Souday, val du Coitron un peu au-dessus de Marigny.— Autour de l'étang de Bois-Vinet.

Lotus major. Scop. — Lieux humides, marécageux. AR.
Baillou, près de la croix du Boulay et ruisseau de Petite-Eau. — Mare près des Aulneaux sur la limite des communes de Mondoubleau et de Choue.— Cormenon, autour des Rouaudières. — Choue. — St-Mars-du-Cor, bois des Grands-Marchais. — Sargé, près de la Crousille et fossés près de Montmarin. — Fossés du chemin de Mondoubleau à Souday. — Autour du moulin de Marigny, sur la limite des communes de Souday et du Plessis-Dorin. — Bords de l'étang de Bois-Vinet. — St-Avit, autour de la Grande Thiéraie.

Astragalus glycyphyllos L. — Gazons secs. R.
Au pied de la vieille tour de Mondoubleau.— Baillou ; dans le champ situé en face du château, bois des Fourneaux, sablière du Pont-du-Bas. — St-Mars-du-Cor, ruines de l'ancien couvent de Beau-Feu (Abbé Segret). — Sargé ; petit bois près de l'Espérance, non loin de Baillou.

Robinia pseudo-Acacia L. — Planté et naturalisé dans les bois, les haies. AC.

Vicia sativa L. — Moissons. Cultivé partout.
Il est bien difficile de savoir si des plantes telles que *Medicago Lupulina* et *sativa, Trifolium pratense* et *Vicia sativa* existaient chez nous à l'état spontané avant d'y être cultivées. Mais nous les voyons depuis longtemps se reproduire et se propager d'elles-mêmes en dehors des cultures, elles ont donc acquis le droit d'occuper une place dans notre flore.

Vicia angustifolia Roth. — Bords des haies, pelouses, bois. C.

Vicia lathyroides L. — Sables. RR.
Cormenon : au Four-à-Chaux ; près et à l'ouest de la Maillardière.

Vicia lutea L. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, moissons autour des Rouaudières. — Baillou, sablière du Pont-du-Bas.

Vicia sepium L. — Bords des haies, buissons, bois. CC.
Varie rarement à fleurs blanches. Je l'ai observé sur le côté nord de la Levée, près de Mondoubleau, à fleurs blanches, à calices et à stipules supérieures d'un vert jaunâtre. Ordinairement, les calices sont bleuâtres, les stipules supérieures fortement maculées en dessous.

Vicia Cracca L. — Haies, buissons. AC.
Le *V. tenuifolia* Roth. a paru en 1888 dans un champ de la Fosse (Choue) qui avait été, l'année précédente, transformé en prairie.
Le *V. varia* Host trouvé à Baillou, haies du potager, n'y a pas persisté (Pilon). Je l'ai observé dans les moissons à la Hérissonnière (Choue) où ses graines avaient sans doute été apportées avec des semences de céréales.

Ervum hirsutum L. var. *eriocarpon* Gr. God. — Lieux herbeux, moissons. C.

Ervum tetraspermum L. var. *leiocarpon* Gr. God. — Lieux herbeux, haies. C.

Ervum gracile DC. — Lieux herbeux, broussailles. RR.
Près de Mondoubleau, broussailles autour d'un petit champ situé à l'angle de la route de Vendôme et du chemin de St-Mars-du-Cor.

Lathyrus Aphaca L. — Moissons RR.
Baillou, moissons autour du jardin potager (Pilon).
Pilon a trouvé dans le Bois-Neuf (Baillou) deux pieds de *Lathyrus Nissolia* L. Graines apportées par les oiseaux? J'ai observé le *L. hirsutus* L. dans les moissons à la Hérissonnière (Choue), son origine est la même que celle du *Vicia varia*.

Lathyrus macrohizus Wimm. (*Orobus tuberosus L.*) — Bois, bords des haies. AR.
Cormenon, bois de la Perche. — Baillou, bois de la Talbotière. — Autour de la Maléclèche, sur la limite des communes de Mondoubleau et de Baillou. — Choue ; bois de la Bellotière, bois d'Assise, bois de la Petite-Barre, bois du Grand-Bouchet. — St-Mars-du-Cor, prés à la Fontaine-Verdeleuse. — Souday, bois de la Bourrelière.

Lathyrus pratensis L. — Prés, bords des haies, buissons. CC.

Lathyrus angulatus L. — Sables. RR.
Cormenon, champs autour des Rouaudières.

Ornithopus perpusillus L. — Sables. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Sargé, au sud de la butte de la Meute (Diard. cat).

Ornithopus compressus L. — Sables. RR.
Diard, cat. Saint-Cal., indique cette espèce à Sargé (au sud de la butte de la Meute) où, suivant M. Franchet, fl. L.-et-Ch., Em. Desvaux l'aurait aussi observée. M. Nouel et moi, nous l'avons vainement cherchée.

ROSACÉES.

Prunus insititia L. — Buissons. R.
Près de Mondoubleau, broussailles à l'extrémité sud de la fosse de la Bonde. — Haies du vieux chemin de Cormenon au Gravier. — Baillou, haies à la Bouchardière.
Souche probable de nombreux Pruniers cultivés. Notre *Prunus insititia*, observé seulement dans le voisinage des habitations, pourrait bien n'être qu'un retour du Prunier cultivé à l'état sauvage.

Prunus spinosa L. — Haies, buissons.
a. *spinosa* (*Pr. spinosa* L. Gr. God.) CC.
Pédoncules glabres, parfois finement pubescents.
b. *fruticans*. (*Pr. fruticans* Weihe. Gr. God.) AC.
Vallée de la Graine. — Haies du vieux chemin de Cormenon au Gravier. — Haies du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. Etc.
Pédoncules glabres ou pubescents.

Prunus avium L. — Bois. AC.
Le *Pr. Mahaleb*, planté dans le parc de Baillou, se retrouve dans un bois voisin, le bois de la Taille.

Spiræa Ulmaria L. var. *denudata* et *glauca* (*Sp. denudata* Hayne et *Sp. glauca* Schultz). — Lieux humides des vallées. CC.

Geum urbanum L. — Bois, buissons. CC.

Potentilla Fragariastrum Ehrh. — Bords des haies, lieux vagues. CC.

Potentilla splendens Ram. — Sables. RR.
Cormenon, allée (de châtaigniers autrefois) près et au sud du château des Rouaudières.

Potentilla verna L. — Lieux secs et incultes. AC.

Potentilla Tormentilla Nestl. — Prés, bords des chemins, bruyères, bois. C.

Potentilla reptans L. — Champs, jardins, bords des chemins. CC.

Potentilla Anserina L. — Lieux humides, AC.

Potentilla supina L. — Bords des étangs. RR.
A l'extrémité ouest du grand étang de Bois-Vinet.

Potentilla argentea L. — Lieux secs R.
Baillou, parc du château et bords du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay.— Choue; bois de Romeau, AC. autour du Grand-Bouchet (Mme de Terras).— Sargé, champs au nord des Virliblés. — Le Plessis-Dorin, champs au-dessus du moulin de Marigny.

Fragaria vesca L. — Bois, buissons, bords des haies. CC.
J'ai observé à Baillou, dans le bois de la Tabèse, le *Fr. elatior* Ehrh. Il y avait autrefois près de ce bois un jardin potager qui dépendait du château de la Tabèse.

Rubus cæsius L. — Champs, buissons, lieux vagues. CC.
Plante quelquefois glanduleuse au sommet : var. *glandulosus* Franch. fl. L.-et-Ch. — Le fruit mûr n'est pas toujours recouvert d'une poussière glauque.

Le *Rub Leguei* Genev. monog. Rubus, éd. 2, p. 31, me semble voisin du *Rub. nemorosus* Hayne. Gr. God. var. *tomentosus* Arrh.

Rubus fruticosus L. Coss. et Germ. fl. Par. éd. 2, 209. — Haies, bois.
a. *glandulosus* (*R. glandulosus* Bell. Gr. God.) R.
Baillou, bois de la Talbotière. — Sargé, bois des Galouries.
b. *discolor*. (*R. discolor* Weihe et Nees. Gr. God.) CC.
c. *tomentosus* (*R. tomentosus* Borckh. Gr. God.) R.

Baillou ; parc du château, haies du chemin de Mondoubleau à la côte de la Talbotière.— Cormenon, champs autour du bois des Tardivières. — Sargé, près de Cour d'Etain.

Le *R. Idæus* L. est naturalisé près de Mondoubleau, dans les broussailles à l'extrémité sud de la fosse de la Bonde.

Rosa arvensis Huds. — Haies, buissons des lieux ombragés C.

Fleurs en corymbe munies à la base de bractées élargies : *R. bibracteata* Bast. Haies du chemin de Mondoubleau à Souday, près de Rocheux.

Rosa stylosa Desv. — Haies.

a. *stylosa* (*R. stylosa* Desv. var. *Desvauxii* Baker Franch. fl. L.-et-Ch.) RR.

Sargé, route de Mondoubleau à Savigny (Franch. loc. cit.)

b. *systyla* (*R. systyla* Bast.) R.

Haies du chemin de Mondoubleau à Souday, près de Rocheux.— Haies du chemin de Mondoubleau à Baillou.— Baillou, parc du château et près des ponts sur la Braye.— Sargé, haies autour de Conival.

J'ai observé à Baillou un *R. canina* L. var *dumalis* (*R. dumalis* Bechst.) qui, par son port et ses fleurs en bouquets, me semble établir le passage entre le *R. systyla* et le *R. canina*.

Rosa canina L, Franch. fl. L.-et-Ch., 185. — Haies. buissons.

a *canina* (*R. canina* Sm.) CC.

b. *Andegavensis* (*R. Andegavensis* Bast.) R.

Haies de la route de Mondoubleau au Temple, près le pont d'Oisnel. — Sur la limite des communes de Sargé et de Savigny-sur-Braye. — St-Agil, haies du chemin de la Fontenelle.

c. *collina* (*R. collina.* Jacq) RR.

Baillou, haies autour de Bois-Vert.

Pédoncules hispides-glanduleux, folioles pubescentes en dessous, surtout sur les nervures. Etablit le passage entre *R. Andegavensis* et *R. dumetorum.*

d. *dumetorum* (*R. dumetorum* Thuill.) AR.

Près de Mondoubleau, haies du Mauvais-Pas et sur la Levée. — Haies du chemin de Mondoubleau à Souday près de la ville.— Autour de la Borde-du-Puits, non loin de Cormenon. — Chemins verts entre Cormenon et Baillou.— Baillou ; parc du château (Pilon), chemin de la Tabèse où je l'ai observé à

folioles arrondies et à fleurs blanches (*R. obtusi folia* Desv. Bor.) — Choue, au bas des bois de Gụériteau.— Sargé, autour du marais de Conival.

Le *R. dumalis* Bechst. ne diffère du *R. canina* que par ses folioles plus ou moins doublement dentées ; or, on observe sur le même rameau des folioles, les unes simplement, les autres doublement dentées. Le *R. dumalis* n'est donc qu'une forme peu tranchée du *R. canina.* Je le crois C.

Rosa tomentosa Sm. var. *subglobosa (R. subglobosa* Sm.) — Haies, buissons. AR.

Mondoubleau, haies du chemin qui descend à l'abreuvoir de la rue Beauvais-de-Saint-Paul. — Cormenon : haies autour du bourg, haies près du Mauvais-Pas. — Choue ; à Guériteau, autour de la Ferpinière. — Haies du chemin de Mondoubleau à Baillou. — Baillou : bois de Roclane, haies aux Chauffetières (Pilon), chemin de Valennes.— Haies de la route de Mondoubleau au Temple. — Haies de la route de Mondoubleau à la Chapelle-Vicomtesse. — Haies de la route de Mondoubleau à Souday. — Sargé, près de la ferme de la Grange. — Souday, autour de Glatigny. — Haies du chemin de St-Agil à la Fontenelle.

Rosa **rubiginosa** L. — Haies, buissons.

a. *rubiginosa (R. rubiginosa* L. Gr. God. *excl. var.)* R.

Broussailles voisines du chemin de Mondoubleau à Baillou, au pont sur le chemin de fer (Peut-être rapporté au R. *umbellata* Leers. Bor., forme à fleurs en corymbe). Haies du même chemin en face de Roclane.— Baillou, chemin de la Tabèse. — Haies de la route de Mondoubleau à la Chapelle-Vicomtesse.

b. *micrantha* (*R. micrantha* Sm.) AR.

Près de Mondoubleau : ravin qui borde le chemin de Baillou à la côte de la Maladrie. — Haies du chemin de Mondoubleau à Souday près de la ville. — Vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Haies autour de Cormenon, AC. — Choue, haies voisines de la Bailliverie. — Baillou, chemin de Valennes. — Haies de la route de Mondoubleau à St-Agil, de la route de Mondoubleau au Temple. — Souday, haies près du moulin de Nouvet. — Sargé, autour de Conival.

Le tube du calice est rarement glabre, plus souvent hispide-glanduleux. — Des échantillons récoltés dans le chemin vert qui conduit de Mondoubleau à Cormenon se rapportent au *R. Lemanii* Bor, qui me semble très voisin du *R. micrantha.*

c. *sepium* (*R. sepium* Thuill.) AC.
Mondoubleau, au pied de la vieille tour. — Près de Mondoubleau, ravin proche et à l'ouest de la fosse de la Bonde. — Haies du parc de Baillou (Pilon). Etc.
Observé, près de Mondoubleau, un *Rosa* qui me semble intermédiaire entre le *sepium* et le *rubiginosa :* il a le port et les fleurs du premier ; les styles sont velus, les pédoncules souvent glanduleux, les folioles souvent arrondies au sommet, caractères qui le rapprochent du second.

Agrimonia Eupatoria L. — Bords des champs, des chemins, CC.
J'ai signalé (Bull. soc. d'agric. sciences et arts de la Sarthe) tout près de notre limite, à Rahay, dans l'allée du bois de Montjoie, l'*Agr. odorata* Mill. que l'on pourra trouver chez nous. On le reconnaîtra aux glandes assez grosses et brillantes qui couvrent la face inférieure de ses feuilles.

Poterium Sanguisorba. L. — Prés secs, lieux vagues et arides. C.
On distingue assez péniblement deux formes :
a. *dictyocarpum* (*P. dictyocarpum* Spach. Gr. God.) Akénes réticulés rugueux.
b. *muricatum* (*P. muricatum* Spach. Gr. God.) Akènes creusés de fossettes denticulées au bord.
Quand il est hérissé dans sa partie inférieure, le *P. dictyocarpum* constitue le *P. Guestphalicum* Boenng. Bor. — Parc de Baillou. — Souday, environs de la Cour.

Alchemilla arvensis Scop. — Champs, jachères. C.

Mespilus germanica. L. — Haies. C.

Cratægus Oxyacantha L. — Haies.
a. *Oxyacanthoides* (*Cr. Oxyacanthoides* Thuill. Gr. God) R.
Cormenon, entre la Borde-Solier et la Borde-des-Tailles. — Choue ; près de la Ferpinière (2 ou 3 styles), haies à l'ouest des Veauxlions. - Autour de Baillou.
Je l'ai trouvé à fleurs d'un blanc jaunâtre.
b. *monogyna* (*Cr. monogyna* Jacq. Gr. God.) CC.
Varie rarement à fleurs roses ou rosées : Cormenon ; haies sur le bord du chemin vert qui conduit à Mondoubleau par la Croix-Bertrand, haies autour de la Borde-Solier.
Je crois, avec M. Franchet, fl. L.-et-Ch., et d'autres bons auteurs, qu'il n'y a pas lieu de considérer comme deux espèces distinctes le *Cr. oxyacanthoides* Thuill. et le *Cr. monogyna* Jacq. On observe en effet sur les mêmes individus :

1° Pédicelles et calices glabres (*oxyacanthoides*) ; feuilles profondément divisées, 1 style *(monogyna)*.

2° Feuilles peu lobées, pédicelles et calices glabres *(oxyacanthoides) ;* pédicelles et calices velus, 1 style (*monogyna*).

D'autre part, il est facile de relier par des intermédiaires la feuille peu lobée du premier à la feuille profondément divisée du second. Le caractère tiré des nervures latérales n'est pas plus constant ; on les trouve, sur la même feuille, arquées dans deux sens différents, concaves ou convexes. Enfin Boreau, fl. centr. éd. 3, dit que les feuilles du *Cr. oxyacanthoides* sont d'un vert foncé et luisantes ; j'ai pu m'assurer que celles du *Cr. monogyna* se présentent quelquefois sous cet aspect.

Pirus communis. L. — Bois, bords des champs. AR.

Dans les champs, avec les poiriers cultivés. — Bois des Grands-Marchais, près de St-Mars-du-Cor.

On rencontre quelquefois la var. *Achras (P. Achras Wallr.)* dont le fruit, arrondi à la base (Pomme-poire des paysans), rappelle par sa forme celui du *Pirus Malus*.

Le *P. salvifolia* DC., originaire de l'Asie-Mineure, est fréquemment cultivé sous le nom de Poirier de Sauge. Suivant Diard, cat. St-Cal., il serait retourné à l'état sauvage dans les bois de Montaillé, de Conflans et dans la forêt de Vibraye.

Pirus Malus. L. — Bois, bords des champs. AC.

Dans les champs, parmi les pommiers cultivés. Çà et là dans les bois. — Bois de Baillou. — Choue, bois de la Raluère (var. *acerba*. *M. acerba* DC.). — Bois des Grands-Marchais près de St-Mars-du-Cor.

Le *P. communis* et le *P. Malus*, recherchés pour faire des *sujets*, sont le plus souvent arrachés avant qu'ils aient pu donner des fruits ; ils persistent dans nos bois malgré cette cause de destruction. On est donc porté à croire que leur origine est due fréquemment à des pépins provenant de variétés cultivées et transportés par les oiseaux.

Le *Sorbus domestica* L. (Cormier) n'existe chez nous qu'à l'état cultivé; on le greffe souvent sur l'aubépine (Pilon). — Autour des champs. AC. à Baillou.

Sorbus torminalis Crantz.— Bois, autour des champs AR.

Bois de la Maladrie, près de Mondoubleau. — Baillou. AC. — Forêt de Montmirail.

ONAGRARIÉES

Epilobium palustre L. — Lieux marécageux. RR.
Sargé, à la Crousille (Em. Desvaux) où je ne l'ai pas retrouvé. — Prés marécageux au bord du ruisseau du Marais, sur la limite des communes de Sargé et de Savigny.

Epilobium tetragonum L. — Bois clairs, fossés. AC.
Mondoubleau, fossés près du Pavillon. — Cormenon, aux Rouaudières. — Baillou ; autour du jardin potager du château, bois de Roclanc, de la Talbotière. Etc.

Epilobium roseum Schreb. — Lieux humides. R.
Mondoubleau, bords de la Graine. — Choue ; abondant près du moulin de Monvalet (bords du chemin qui conduit au bourg) ; bois de Guériteau, entre l'allée du bas et le ruisseau. — Chemin de Choue à Souday, aux Julanières. —Vieux chemin de Souday à Vibraye, au pied des murs de la ferme de Taillefer.

Epilobium montanum L. — Bois. C.

Epilobium lanceolatum Seb. et Maur. — Lieux humides ; bois, haies. R.
Baillou, parc (Pilon). — Choue ; autour des Souches, du Grand-Bouchet. — St-Agil ; haies en face des Cirotières sur le bord du chemin de la Fontenelle. — Souday ; bois entre Taillefer et Chalopin ; autour du château de la Cour ; bois de la Brousse. — Beauchêne, autour des batiments du Pavillon. — Le Plessis-Dorin, près de Chiloup.
Les feuilles florales de l'*Ep. lanceolatum* vont en décroissant à mesure qu'elles se rapprochent du sommet de la tige ; j'ai remarqué que les dernières ou les avant-dernières sont très souvent plus grandes que celles qui leur sont immédiatement inférieures.

Epilobium parviflorum Schreb. — Lieux humides. C.
Je l'ai observé à Baillou, au bord du ruisseau de Petite-Eau, avec des feuilles toutes sensiblement pétiolées, luisantes et glabrescentes en dessus.

Epilobium hirsutum L. — Bords des eaux vives. C.
On rencontre à Sargé, dans les bois de Fief-Corbin, quelques pieds d'*Œnothera biennis* L., plante de l'Amérique du Nord naturalisée dans beaucoup de localités.

Isnardia palustris L. — Bords des étangs, fossés. RR.
Cormenon, à l'étang des Rouaudières. — Sargé, fossés du chemin qui conduit à l'Aunaie.

Circæa Lutetiana L. — Bois humides, bords des ruisseaux. AR.
Cormenon; au pont sur le ruisseau du Parc, bois de la Borde-Solier (près de la mare). — Choue; bois de Guériteau, prés au-dessous de Pontron, à la Combraise. — Baillou; ruisseau de Petite-Eau, particulièrement au bois des Fourneaux. — Sargé; bords de la Graine au-dessous du moulin du Gravier. — Fossés à Alleray près de St-Agil. — Souday; bois d'aunes au-dessus du moulin de Chalopin, prés et bois marécageux à Tertre-Rouge. — Oigny; val du Coitron au-dessous de la Pilardière, ravin près des Gillardières. — St-Avit, autour de la Grande-Thiéraie.

HALORAGÉES

Myriophyllum verticillatum L. — Eaux tranquilles. AC.
Baillou, C. Sargé, à l'Aunaie. Etc.

Myriophyllum spicatum L. — Eaux tranquilles. AC.
Baillou, dans la Braye. — Etang de Bois-Vinet. Etc.
C'est par oubli sans doute que Diard, cat. St-Cal., n'indique pas cette plante, commune autour de nous.

Myriophyllum alterniflorum DC.— Etangs, mares. AR.
Dans la Graine près de Mondoubleau (Franchet). — Mare près des Aulneaux sur la limite des communes de Mondoubleau et de Choue. — Baillou, grande mare du parc (Pilon). — St-Mars-du-Cor, mare près de Beau-Feu. — Choue; mares formées par le ruisseau qui passe au-dessous de Bel-Air, mare du Tronchet (Mme de Terras). — Sargé, étangs des Brosses et des Rousselières. — Etang de Bois-Vinet.
Le *Trapa natans* L. a été planté à la Grande-Thiéraie (St-Avit). M. de Maricourt, propriétaire de la Grande-Thiéraie, qui m'a donné ce renseignement, ayant fait curer et laissé à sec pendant deux ans l'étang où croît le *Trapa*, celui-ci reparut quand l'étang fut rempli de nouveau.

CALLITRICHINÉES.

Callitriche aquatica Huds. Coss. et Germ. fl. Par. éd. 2, 604. — Rivières, ruisseaux, fossés.

a. *stagnalis* (*C. stagnalis* Scop. Gr. God.) C.

b. *verna* (*C. verna* Kutz. Gr. God.) — Je n'ai pas observé cette forme intermédiaire entre le *C. stagnalis* et le *C. hamulata*, mais elle se trouvera certainement dans notre canton.

c. *hamulata* (*C. hamulata* Kutz. Gr. God.) — Paraît R. Près de Mondoubleau, rigoles des près du Foulon. — Choue ; au pont de GUériteau et mare du Tronchet (Mme de Terras).

CÉRATOPHYLLÉES.

Ceratophyllum demersum L. — Eaux stagnantes. AC. Diard, cat. St-Cal, n'indique pas de *Ceratophyllum*.

LYTHRARIÉES.

Lythrum Salicaria L. — Bords des eaux. CC.

Lythrum Hyssopifolia L. — Lieux humides, inondés l'hiver. AR.
Près de Mondoubleau, à Bellevue. — Autour des Gandonnières, près de Cormenon. — Fossés du vieux chemin de Cormenon à Sargé. — Fossés du chemin de Cormenon au Temple.— Choue ; près de Monvalet, bois de Guériteau.— Baillou : parc du château, fossés à la croix du Boulay, vieux chemin allant de la Maladrie à Courtay. — Bords du chemin de Mondoubleau à Souday. — Beauchêne, au Pavillon. — Souday : fossés dans le bourg, bois des Bouleaux. — Etang de Bois-Vinet. C. au nord de ce même étang, fossés des chemins. — Bords du chemin de St-Agil à la Fontenelle.

Peplis Portula L. — Fossés, Bords des mares. C.

CUCURBITACÉES.

Bryonia dioica Jacq. — Haies. AC.

PORTULACÉES.

Portulaca oleracea L. — Jardins, cours, rues. AC.

Montia fontana L. var. *minor* Koch (*M. minor* Gmel Gr. God.) — Lieux sablonneux. RR.
Parc de Baillou : allées du Bois-Neuf.

PARONYCHIÉES.

Herniaria glabra L. — Jachères, lieux vagues. C.

Herniaria hirsuta L. — Jachères, lieux vagues. C.

Corrigiola littoralis L. — Lieux sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Sargé, autour des Brosses. — Autour de l'étang de Bois-Vinet.

Scleranthus annuus L. — Champs. C.

CRASSULACÉES.

Tillæa muscosa L. — Terrains sablonneux. RR.
Je l'ai vainement cherché sur la butte de la Meute (Sargé) où Diard, cat. St-Cal., l'indique.

Sedum Telephium L. — Lieux frais, bois, bords des eaux. AC.

Sedum Cepæa L. — Talus des haies. C.

Sedum rubens L. — Champs, talus des haies. C.

Sedum reflexum L. — Lieux sablonneux AC.

Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou, sablière près du bourg (Pilon). — Chemin de Choue au Grand-Bouchet, abondant. Etc.

J'ai observé le *S. rupestre* L., plante robuste, glauque, à Mondoubleau, sur les murs de l'ancienne ville.

Sedum elegans Lej. — Lieux sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Sargé, au Fief-Corbin. — Oigny, bords du chemin de César près de la Galasière.

GROSSULARIÉES

Ribes Uva crispa L. — Haies, bois. AC.
Haies derrière le Mauvais Pas et bois de la Maladrie, près de Mondoubleau. — Cormenon, val du ruisseau du Parc où il est assez fréquent. — Baillou, bois des Fourneaux (Pilon). Etc.

Le *R. Uva crispa* se rencontre souvent dans le voisinage des habitations où sa spontanéité est bien douteuse. — Nous n'avons probablement ici que la var. *pubescens* Gr. God. (Ovaires pubescents).

Ribes rubrum L. — Lieux frais ; bords des eaux, bois. AC.
C. dans le val de la Graine.— C. à Baillou.— Val du Coitron.

SAXIFRAGÉES

Saxifraga granulata L. — Prés, bois. CC.

Saxifraga tridactylites L. — Lieux sablonneux, murs, toits. C.

Chrysosplenium alternifolium L.— Filets d'eau dans les bois marécageux. RR.
Choue ; bois de Guériteau (partie voisine du ruisseau, vis-à-vis des Veauxlions).

Chrysosplenium oppositifolium L.— Ruisseaux des terrains marécageux. R.
Sargé ; fontaine et fossés à l'entrée d'un pré situé sur le

bord de la route de Mondoubleau, près de la borne 42 (se retrouve dans les rigoles des prés voisins); bords du ruisseau du Marais. — Oigny, fontaine de la Pilardière.

OMBELLIFÈRES.

Daucus Carota L. — Lieux secs ; jachères, prés, pelouses. CC.
Fleurs toutes purpurines (Baillou) ; fruits étroits et allongés, à poils courts (Baillou, parc). Pilon.

Torilis Anthriscus Gmel. — Haies, buissons. CC.

Torilis helvetica Gmel. — Jachères, lieux vagues. CC.

Torilis nodosa Gærtn. — Gazons secs. RR.
Au pied de la vieille tour de Mondoubleau.

Angelica silvestris L. — Lieux humides, bords des eaux. C.

Selinum Carvifolia L.— Bords des haies, bois, buissons. AR.
Choue, val de la Graine au-dessous de Quincampoix. — Bois sur la gauche du vieux chemin de Mondoubleau à la Cour, à la hauteur de Villeray. — Souday ; broussailles sur le bord du chemin de César, près de Monidée ; bois autour de Tertre-Rouge.— Grands Bois de Saint-Agil. — Bois entre la Violerie et l'étang de Bois-Vinet, sur la limite des communes de Souday et du Plessis-Dorin.— Rives de l'étang de Bois-Vinet.— St-Avit ; prés au nord du même étang, abonde autour de la Grande-Thiéraie.

Heracleum Sphondylium L. — Prés, bois. CC.

Silaus pratensis Bess. — Prés, chaintres. CC.

Æthusa Cynapium L. — Jardins, buissons. C.
Trop répandu dans les jardins. — Choue, abonde au bas des bois de Guériteau. — AC. dans le val de la Graine au-dessus de Cormenon.

Œnanthe Lachenalii Gmel. — Lieux marécageux R.
Sargé ; terrains vagues au sud de l'Aunaie et marais de Conival.

Œnanthe peucedanifolia Poll. — Prés humides. C.

Œnanthe fistulosa L. — Fossés, bords des étangs. R. Val de la Braye entre Baillou et Sargé à la hauteur du moulin de Villejus. — Prés sur le bord de la route de Mondoubleau à Sargé. — Sargé, bords de la Braye au-dessous du pont de Montmarin. — Etang de Bois-Vinet.

Œnanthe Phellandrium L. — Mares, étangs. R.
Cormenon, étang des Rouaudières — St-Mars-du-Cor, mare aux Grands-Marchais.— Mare sur le bord du chemin de Souday à Planche-Hubert. — Etang de Bois-Vinet.
Je ne considère pas comme appartenant à notre flore le *Bupleurum tenuissimum* L. trouvé une seule fois sur le bord du chemin de Mondoubleau à Baillou, près de la Maladrie, et observé par M. l'abbé Segret (quelques individus) dans la ruelle de la Borde-du-Puits, près de Cormenon.

Sium angustifolium L. — Eaux vives et peu profondes. AC.
Dans la Graine (Cormenon, au-dessous de la Poterie). — Dans la Braye. — Dans le Coitron.

Pimpinella magna L. — Haies des prés, buissons. AR.
Mondoubleau, val de la Graine. — Choue : à Guériteau, prés au-dessous de Pontron, bois de la Bellotière. — Environs de Sargé. — Souday : abonde à la Cour, bords du Coitron près du moulin de Chalopin, bois des Bouleaux.

Pimpinella Saxifraga L. — Bords des champs, des chemins, clairières des bois. CC.
Feuilles à segments très découpés : var. *dissecta* Coss. et Germ. (*P. pratensis* Thuill). Baillou ; bois de la Taille (Pilon), bois de la Talbotière.
Plante très variable ; les folioles des feuilles sont petites ou aussi larges que dans *P. magna.*

Carum verticillatum Koch. — Lieux humides, prés, pelouses. AC.
Baillou au carrefour de la croix du Boulay. — Bords de l'étang de Bois-Vinet. Etc.
L'*Ægopodium Podagraria* L., naturalisé autour du presbytère de Cormenon, n'existe plus au bord du ruisseau du Parc où je l'avais indiqué à M. Franchet (Fl. L.-et-Ch., 237).

Sison Amomum L. — Haies. AR.

Mondoubleau, haies près de la Corbonnerie. — Choue : chemin de la Fosse, champs autour des Veauxlions, abondant au Grand-Bouchet. — Baillou : autour du bourg, entre Roclane et la Vallée, près de Fosse-Ronde. — Souday, champs sur le bord du chemin de Valennes.

Helosciadium nodiflorum Koch. — Ruisseaux, fossés.
a. *nodiflorum*. CC.
b. *intermedium* Coss. et Germ. R.
Sargé, fossés du marais de Conival. — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Scandix Pecten-Veneris L. — Moissons. CC.

Anthriscus vulgaris Pers. — Lieux sablonneux. RR.
Baillou, autour de l'église et près de la sablière du bourg (Pilon).

Anthriscus silvestris Hoffm. — Prés, bords des haies. RR.
Le Temple : abonde dans les haies d'un pré situé sur le bord et à droite de la route de Mondoubleau, et joignant le bourg.

Conopodium denudatum Koch. — Bois. RR.
Taillis du parc de Baillou (côté de la Gaulerie).

Chærophyllum temulum L. — Bords des haies. C.

Conium maculatum L. — Haies, lieux vagues R.
Au pied de la vieille tour de Mondoubleau. — Baillou, C. autour du bourg (Pilon). — Haies des prés situés sur la gauche du vieux chemin de Cormenon au Gravier, à la hauteur de la Tuilerie.

Hydrocotyle vulgaris L. — Lieux humides ou marécageux, bords des étangs. AC.
Cormenon, à l'étang des Rouaudières. — Baillou : près du moulin de Frécul, prairie de Villejus. — Sargé, bords de l'étang des Brosses. Etc.

Eryngium campestre L. — Lieux incultes. C.

Sanicula europæa L. — Bois. AR.
Bois de la Maladrie près de Mondoubleau. — Bois sur le bord du chemin de Mondoubleau à St-Mars-du-Cor. — Cormenon, bois près du Petit-Gaulay. — Choue, bois de la Bellotière. — Baillou, bois de la Tabèse et de la Talbotière.

— Souday, près de la Cour et bois des Joncs. — Val du ruisseau du Marais sur la limite des communes de Sargé et de Savigny. — Forêt de Montmirail.

ARALIACÉES

Hedera Helix L. — Murs, arbres. CC.
Rampe souvent dans les bois, il est alors stérile (var. *sterilis* Lob.) et ses feuilles sont à 3 ou 5 lobes.

CORNÉES

Cornus sanguinea L. — Haies, buissons. C.

LORANTHACÉES

Viscum album L. — CC. sur les poiriers, les pommiers ; on l'observe aussi quelquefois sur les acacias, les peupliers, très rarement sur l'érable champêtre et sur l'aubépine.

Dans le parc de Baillou, le gui croît sur les tilleuls, *l'Acer platanoides* L., le *Pavia flava* DC., le *Prunus Mahaleb* L., le *Prunus Padus* L., le *Sorbus Aucuparia* L., le *Sorbus hybrida* L. ; dans le potager du château sur les pruniers et les cerisiers (Pilon).

CAPRIFOLIACÉES

Adoxa Moschatellina L. — Lieux frais ; bois, haies. AC. Côté nord de la Levée, près de Mondoubleau, où M. Gautier-Lacroze, pharmacien à Clermont-Ferrand, m'a dit l'avoir récolté il y a une cinquantaine d'années. — Abonde dans les bois de Baillou. — Choue, bois de Gériteau. Etc.

Sambucus Ebulus L. — Lieux vagues. AC.

Sambucus nigra L. — Lieux frais ; haies, bois. AC.
R. dans les bois. Baillou, bois de Roclane.

Dans le haut d'un champ situé au-dessus et au sud-ouest de la ferme de Taillefer (Souday), je l'ai trouvé à feuilles panachées. On observait sur le même individu des feuilles panachées et des feuilles entièrement vertes. Provenait peut-être du parc de la Cour qui n'est pas très éloigné?

Viburnum Opulus L. — Haies et bois frais. AC.
Val de la Graine. — Val de la Braye. — Baillou, bois des Fourneaux. Etc.

Lonicera Periclymenum L. — Haies, buissons. C.
On observe quelques pieds de *L. Xylosteum* L. dans les bois voisins du parc de Baillou (bois de Roclane, des Fourneaux) où cet arbrisseau a été planté.

RUBIACÉES

Galium Cruciata Scop. — Bords des champs, des chemins. C.

Galium verum L. — Lieux secs; prés, pelouses. C.

Galium vero-Mollugo Wallr. (*G. decolorans* Gr. God.)— Lieux secs. RR.
Levée de l'étang de Bois-Vinet, près de la bonde.

Galium Mollugo L. — Haies, buissons.
a. *elatum (G. elatum* Thuill. Gr. God.) CC.
b. *erectum* (*G. erectum* Huds. Gr. God.) Paraît R.
Mondoubleau, bords de la Graine. — Près de Cormenon, dans la Brousse.

Galium silvestre Poll. —Gazons secs.
a. *læve* (G. *læve* Thuill.) AC.
Baillou; haies du parc, bois de la Talbotière. Etc.
b. *Bocconi* (G *Bocconi* DC.) Plus rare que la var. précédente.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou; terrains incultes devant le château, bois des Fourneaux.— Sargé, autour du bois des Galouries.

Galium palustre L. — Bords des eaux. C.

Galium uliginosum L. — Fossés, lieux marécageux. R.

Cormenon, autour de l'étang des Rouaudières. — Choue, prés à la Combrayse. — Sargé, marais de Conival et au-dessus du moulin du Marais.

Galium parisiense L. (G. *anglicum* Huds.) — Bruyères. RR.
Sargé, butte de la Martinière où Em. Desvaux l'avait observé.

Galium Aparine L. — Bois, buissons, haies, jardins. CC.

Asperula odorata L.— Bois. RR.
Choue, petit bois situé au-dessous et à peu près à l'ouest de la Petite-Barre. — Forêt de Montmirail, entre la Coquetterie et la route de Montmirail à la Bazoche-Gouet.

Asperula cynanchica L. — Lieux secs et sablonneux. RR.
Cormenon, buttes-du-Four-à-chaux (à l'est).
M. Franchet, fl. L.-et-Ch., indique vers la Pilonnière (Choue), d'après Em Desvaux, *l'Asp. arvensis* L. que je n'ai pas vu dans le canton de Mondoubleau et qui ne s'y trouvait probablement qu'à l'état de plante adventice.

Sherardia arvensis L. — Champs, gazons. AC.
C. à Baillou dans les gazons, varie souvent à fleurs blanches (Pilon).

VALÉRIANÉES

Valeriana officinalis L. — Lieux humides, bords des eaux. AC.

Valeriana dioica L. — Prés humides, marécageux. AC.

Valerianella olitoria Poll. — Lieux cultivés, jardins, champs. C.

Valerianella carinata Lois. — Jardins, champs. C.
Je l'ai observé à fruits pubérulents.

Valerianella Auricula DC. — Moissons. C.

Valerianella Morisonii DC. — Moissons des terrains sablonneux. RR.
Cormenon, moissons autour des Rouaudières.
Fruit glabre ou pubescent.

DIPSACÉES

Dipsacus silvestris Mill. — Lieux incultes, jachères, bords des chemins. C.

Mon ami Pilon a trouvé une seul fois, près de nos limites, au moulin du Bas-Montjoie (Rahay, Sarthe), le *Dispsacus pilosus* L. (Août 1863). Il provenait sans doute de graines amenées par les eaux.

Knautia arvensis Koch.— Prés secs, bords des champs. C.

Scabiosa columbaria L. — Terrains sablonneux. R.
Haies du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Baillou ; sablière du bourg, gazons du parc auprès du Manège où il est abondant (Pilon), autour des Chauffetières. — Bords de la route de Mondoubleau à Sargé à la côte de la Varasse.
Varie rarement à fleurs blanches.

Scabiosa Succisa L. — Lieux frais ; bois, prés. CC.

SYNANTHÉRÉES

Eupatorium Cannabinum L. — Bords des eaux. C.

Tussilago Farfara L. — Terrains argileux. R.
Choue ; près des ruines de Guériteau, au Grand Bouchet. — Sargé, près des Fontaines. — Ravin sur le bord du vieux chemin de Mondoubleau à Planche-Hubert.
Le *T. Parfara* fleurit chez nous au mois d'avril, et non dès le mois de février comme le dit Boreau.

Solidago Virga-aurea L. — Bois. C.

Erigeron canadensis L. — Bois, sables. C.
Originaire de l'Amérique septentrionale. Il s'est depuis deux siècles naturalisé dans toute l'Europe.

Erigeron acris L. — Lieux secs ; bords des chemins, bois. AC.
Baillou ; parc du château, bois de Roclane. — Choue, à la côte de Guériteau. Etc.

Bellis perennis L. — Prés, gazons. CC.

Senecio vulgaris L. — Champs. jardins. CC.
Forme à rameaux jaunâtres au sommet, à akènes allongés et stériles : près de Mondoubleau, champs autour de la Minauderie.

Senecio silvaticus L. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, bords d'un grand champ situé près et au sud des Rouaudières. — Bois de la Galantinerie près de St-Mars-du-Cor. — Moissons sur le bord de la route de Mondoubleau au Temple, vers le Bois-d'Assise.

Senecio aquaticus Huds. — Prés humides.
a. *aquaticus* (*S. aquaticus* Huds. *genulnus* Gr. God.) AC.
b. *pratensis* (*S. pratensis* Richt. Bor. fl. centr. éd. III, nº 1310. S. *barbaræfoluis* Reich. *S. aquaticus* Huds. *pennatifidus* Gr. God.) AR.
Val de la Graine (Mondoubleau, C. dans le Pré-Barré). — Val de la Braye.
M. Lamotte, à qui j'ai soumis cette forme remarquable, l'aurait volontiers rapportée au *S. erraticus* Bertol., plante de la région méditerranéenne suivant M. Franchet.

Senecio Jacobæa L.—Lieux secs; prés, bords des champs. des chemins. CC.

Artemisia vulgaris L. — Voisinage des habitations. R.
Mondoubleau, butte de la tour. — Baillou, C. autour du bourg. — Choue, à la Combrayse. — Le Plessis-Dorin, à Bois-Vinet.
On observe à Mondoubleau, au pont des Grands-Moulins, quelques pieds de *Tanacetum vulgare* L. échappés des jardins.

Chrysanthemum Leucanthemum L. — Prés, jachères, bois. CC.
Je l'ai vu, dans le parc de Baillou, à capitules dépourvus de demi-fleurons. Sur un individu quelques demi-fleurons s'étaient développés au milieu du capitule.

Matricaria inodora L.— Lieux humides ; bords des fossés, des chemins. R.
Sargé, fossés près de la Buffière et prés humides au-dessous du bourg. — Arville, bords de la route de Mondoubleau à la Bazoche-Gouet.

Anthemis nobilis L. — Bords des chemins, gazons. C.
Paillettes du réceptacle glabres ou velues au sommet.

Anthemis arvensis L. — Moissons, lieux sablonneux. RR.

Le Plessis-Dorin, moissons autour de la Herserie.

Anthemis Cotula L. — Champs, décombres. CC.

Achillea millefolium L. — Lieux secs ; bords des champs, des chemins. CC.

Achillea Ptarmica L. — Prés humides, bords des eaux. AC.

Bidens tripartita L. — Bords des eaux. AC.
Cormenon, au gué des Planches. — Sargé, étang des Brosses. — Souday, au gué de la Cour. Etc.

Bidens cernua L. — Bords des eaux. AC.
Cormenon ; au gué des Planches, aux Rouaudières. — Choue, au moulin de Monvalet. — Autour de l'étang de Bois-Vinet. Etc.

Inula Conyza DC. — Bois, lieux incultes. AR.
Prés de Mondoubleau, sur la Levée. — Vieux chemin de Mondoubleau à Vibraye, au carrefour du Poirier. — Vieux chemin de Cormenon à Sargé. — Baillou ; haies près de la Talbotière, bois. — Autour du Grand-Bouchet.

Pulicaria dysenterica Gærtn. — Bords des eaux. C.

Pulicaria vulgaris Gærtn. — Lieux inondés l'hiver ; bords des chemins, fossés C.

Pulicaria graveolens Desf. — Jachères, bords des chemins. AC.
Choue ; à la Fosse, autour du Grand-Bouchet. — Baillou ; C. dans les champs du parc, cour des Chauffetières. — Souday, champs autour de la Bourrelière (R. Chudeau). Etc.

Gnaphalium luteo-album L. — Bois et lieux frais. AR.
Baillou : Bois-Neuf (Pilon), bois de Roclane et de la Talbotière ; au pont sur la Braye. — Choue, bois de Guériteau. — Parc et Grands Bois de Saint-Agil.— Souday ; bois sur le bord du chemin de Glatigny à la Cour, bois des Bouleaux. — Autour de l'étang de Bois-Vinet.

Gnaphalium silvaticum L. — Bois. RR.
Baillou ; bois de la Talbotière (allée qui du chemin de Mondoubleau conduit au petit pavillon), bois de Roclane. — Forêt de Montmirail.

Gnaphalium uliginosum L. — Lieux humides, inondés l'hiver. CC.

Gnaphalium dioicum L. — Bruyères. RR.
Sargé : bruyère du Chêne-la-Bosse ; autour de la Pierre qui tourne à minuit où Diard l'indique (cat. St-Cal.)

Filago spathulata Presl. — Jachères, bois. AR.
Mondoubleau, chemins verts autour de Rocheux. — Champs autour de la Bonde, près de Mondoubleau. — Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou. — Bords du chemin de Mondoubleau à Souday. — Baillou : champs du parc, champs de la Gaulerie où il est C., bois de la Talbotière, champs autour de la Bretonnière. — Choue ; aux Petites-Pierres, aux Souches. — St-Agil, champs.

Filago germanica L. var *canescens* (*F. canescens* Jord.). — Jachères, lieux vagues. CC.

Filago minima Fr. — Sables. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Sargé, sables autour des Brosses.

Filago gallica L. — Champs, lieux vagues. C.
Lefrou, cat. L.-et-Ch. p. 15, indique comme naturalisé autour du vieux château de Mondoubleau l'*Echinops sphærocephalus* L. Je ne l'y ai jamais vu. Boreau, fl. centr. éd. 3, reproduit l'indication de Lefrou, il ne mentionne pas que la plante est naturalisée.

Onopordon Acanthium L. — Lieux incultes, bords des chemins. R.
Mondoubleau, butte de la tour. — Baillou ; près du bourg, où il varie à fleurs blanches, et près de la sablière du Pont-du-Bas.

Cirsium lanceolatum Scop. — Lieux vagues, bords des chemins, C.

Cirsium eriophorum Scop. — Lieux vagues, bords des chemins. RR.
Baillou, chemin de Roclane à la Vallée où il est abondant.

Cirsium palustre Scop. — Prés marécageux. AC.

Cirsium anglicum Lob. — Prés humides. AC.

Cirsium acaule All.— Bords des champs, des chemins. C.

Cirsium arvense Scop. — Lieux secs ; jachères, bords des chemins. CC.
Je l'ai observé à feuilles inférieures décurrentes.

Carduus nutans L. — Jachères, bords des chemins. C.
Varie très rarement à fleurs blanches.

Centaurea Jacea Coss. et Germ. fl. Par. éd. 2, 484.
a. *Jacea* (*C. Jacea* L. Gr. God.) R.
Champs sur le bord de la route de Souday à Montmirail. — Souday, parc de Glatigny.
b. *pratensis* (*C. pratensis* Thuill. *C. nigrescens* Willd. Gr. God.) — Prés, pelouses. CC.
Fleurs extérieures le plus souvent rayonnantes : le Temple, gazons du parc de la Fredonnière où cette forme est abondante. — J'ai récolté à Baillou, dans le chemin vert qui passe auprès des Chauffetières, où M. Franchet l'avait montré à Aug. Pilon, le *C. microptilon* Gr. God. qui me semble être une forme du *C. pratensis.*
c. *nigra* (*C. nigra* L. Gr. God.) — Bords des chemins. AR.
Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou à la côte de la Maladrie. — Cormenon, prés à la Borde-Solier et aux Rouaudières. — Sargé, parc du Fief-Corbin (Franchet). — Environs de St-Avit.
La distinction des *Cent. pratenis* Thuill. et *nigra* L. repose principalement sur la longueur des cils de l'appendice des folioles involucrales, caractère qui paraît variable, et sur l'absence ou la présence de soies formant aigrette et surmontant l'akène. Certains individus présentent des akènes à soies très courtes et l'on se demande à laquelle des deux formes on doit les rapporter. Je partage l'opinion de M. Lloyd, fl. Ouest, éd. 4. 201, qui dit en parlant des *Centaurea* du groupe *Jacea* « elles offrent des intermédiaires d'une détermination embarrassante et justifient l'opinon des auteurs qui les réunissent comme variétés d'une même espèce. »

Centaurea Cyanus L. — Moissons, surtout dans les terrains sablonneux. AC.
Cormenon, C. autour des Rouaudières. — Baillou, autour des Chauffetières.— Çà et là dans les champs.

Centaurea Scabiosa L. — Champs secs. R.
Champ au midi de la Brousse près de Cormenon. — Champs

sur le bord du chemin de Mondoubleau à St-Mars-du-Cor, (au pont d'Oisnel).— Baillou, champs en face du château.

Centaurea calcitrapa L. — Bords des chemins, cours des fermes. C.

Serratula tinctoria L. — Bois. R.
Bois des Grands-Marchais, près de St-Mars-du-Cor. — Grands Bois de Saint-Agil. — Souday, bois autour de Tertre-Rouge. — Varie rarement à fleurs blanches.

Carlina vulgaris L. — Bords des chemins, gazons. C.

Lappa communis Coss. et Germ. fl. Par. éd. 2, 480.
a. *minor* (*L. minor* DC. Gr. God.). — Bois, lieux vagues. AC.
b. *major* (*L. major* Gærtn. Gr. God.). — Bords des eaux vives, bois frais. R.
Baillou, au pont sur la Braye. — Souday ; bois des Joncs près de Tertre-Rouge. — Le Plessis-Dorin, autour de la ferme du Grand-Buisson (Abbé Segret).
Les anthodes sont plus ou moins gros, sessiles ou plus ou moins pédonculés, parfois légèrement aranéeux à la base. J'ai observé sur le même individu l'inflorescence du *L. minor* et les akènes rugueux au sommet du *L. major*. Enfin je ne puis voir sur des spécimens de *L. major*., bien caractérisés d'ailleurs, que les bractées internes de l'involucre soient plus courtes que les externes. Ces mêmes spécimens offrent des akènes marbrés : Kirschleger, fl. Vogéso-rhén., dit que dans *L. major* ils sont unicolores, et tachetés ou marbrés dans *L. minor*. En résumé, le *L. major* me semble un *L. minor* très developpé dans toutes ses parties et dont les anthodes sont disposés en une inflorescence corymbiforme.

Cichorium Intybus L. — Lieux vagues ; bords des champs, des chemins. C.
Varie à fleurs blanches.

Arnoseris pusilla Gærtn. — Terrains sablonneux. RR.
Cormenon, champs à la Maillardière. — Sargé, autour de la Pierre qui tourne à minuit.

Lapsana communis L. — Bois, jardins, décombres. CC.

Hypochæris glabra L. — Terrains sablonneux. RR.
Cormenon, près de la sablière de la Maillardière.

Hypochœris radicata L. — Prés, pelouses. CC.

Thrincia hirta Roth. — Prés, pelouses, champs. AC.

Leontodon autumnalis L. — Prés, gazons. CC.

Leontodon hastilis L. var. *hispidus* (*L. hispidus* L.) — Prés, bords des champs et des chemins. CC.

Picris hieracioides L. — Lieux secs ; bois, broussailles, murs. AC.

Scorzonera humilis L. — Lieux humides ; prés, bois. C.

Tragopogon pratensis L. — Prés. C.

Chondrilla juncea L. — Sables. RR.
Cormenon, à la sablière de la Maillardière. — Sargé, terrains sablonneux au nord-ouest du bourg.

Taraxacum officinale Wigg.
a. *officinale* (*T. officinale* Wigg. Franch. fl. L.-et-Ch.).— Prés, bords des champs et des chemins, jardins. CC.
b. *palustre* (*T. palustre* DC. Franch. fl. L.-et-Ch). — Prés humides. R.
Val du ruisseau du Parc au-dessus de Cormenon. — Prés entre Choue et Guériteau. — Baillou, prairie de Villejus. — Sargé ; prés sur le bord de la route de Mondoubleau vers les Pâtis.

Lactuca saligna L. — Lieux pierreux. RR.
Premier pont du chemin de fer au-dessous de Mondoubleau (entre les pierres qui revêtent le talus bordant la voie). Plante introduite, semble complétement naturalisée.

Lactuca scariola L — Lieux vagues, bords des chemins. R.
Baillou, autour du bourg. — Feuilles entières ou lobées

Lactuca muralis Fres. — Bois. AR.
Bois du Tertre près de Mondoubleau. — Baillou, bois de la Talbotière. — Choue, haies du chemin qui du Grand-Bouchet conduit aux Souches (Mme de Terras). — Souday ; à la Cour, bois près de la ferme de Taillefer. — St-Agil, haies en face des Cirotières. — Saint-Avit, autour de la Grande-Thiéraie.

Sonches oleraceus L. — Jardins, voisinage des habitations. CC.

Sonchus asper Vill. — Champs, jardins. CC.
J'ai rencontré quelquefois, à l'état accidentel, le *Sonch. arvensis* L. plante des terrains calcaires. — Champs autour de la Nardière, près de Cormenon. — Champs au sud de la Borde-Solier, près de Mondoubleau. — Baillou, dans le parc. — Sargé, champs dans le val de la Braye au-dessus du bourg.

Crepis taraxacifolia Thuill. — Prés. C.
On observe çà et là, dans les prairies artificielles, dans les lieux vagues, le *Cr. setosa* Hall. qui nous vient de la région méditerranéenne. — Autour de Cormenon, de Choue. — Baillou, dans le parc (Pilon).

Crepis fœtida L. — Lieux secs ; sables, terrains vagues. R.
Mondoubleau, butte de la tour. — Cormenon, sables à la Maillardière.

Crepis biennis L. — Prés. R.
Petit pré sur le bord du chemin de Mondoubleau à la Chapelle-Vicomtesse. — C. dans le parc du Grand-Bouchet (Mme de Terras).
Plante introduite ; on ne la rencontre que dans les prairies artificielles.

Crepis virens Vill. — Lieux vagues, champs. CC.
Les tiges sont dressées, simples ou peu rameuses (*Cr. stricta* DC.), ou nombreuses, diffuses (*Cr. diffusa* DC.). L'involucre est quelquefois glanduleux.

Hieracium pilosella L. — Lieux secs ; bords des champs, des prés, talus des haies. CC.

Hieracium Auricula L. — Prés, gazons. AC.
Val du ruisseau du Parc, au-dessus de Cormenon. — Choue ; bords de la route de Mondoubleau à St-Agil, vers Guériteau. — Baillou, bois de la Tabèse. Etc.
Je l'ai observé : avec la tige munie, du sommet à la base, de poils glanduleux ; avec le péricline dépourvu de poils noirs.

Hieracium murorum L. Coss. et Germ, fl. Par éd. 2, 543. Bois, murs. C.
a. *murorum* (*H. murorum* Vill. Gr. God.).
b. *silvaticum* (*H. silvaticum* Lam. Gr. God. *H. vulgatum* Fr.).

Hieracium boreale Fr. — Bois découverts. R.

Baillou, parc. — Choue, bois à l'est de Montluisard. — Grands Bois de Saint-Agil. — Souday, bois sur le bord du chemin qui conduit de Glatigny à la Cour. — Forêt de Montmirail.

Hieracium umbellatum L — Bois, bords des chemins. AC.
Val du ruisseau du Parc au-dessus de Cormenon. — Baillou, bois de la Talbotière. — Parc du Grand-Bouchet. Etc.

LOBÉLIACÉES

Lobelia urens L. — Lieux humides ou marécageux. AR.
Broussailles sur le bord du chemin de Mondoubleau a Baillou, à la borne 2. — Baillou, bois près de l'Etoile. — Bois des Grands-Marchais près de St-Mars-du-Cor. — Choue, autour du Grand-Bouchet. — Grands Bois de Saint-Agil. — Souday, bois des Mineries près de Tertre-Rouge. — Rives de l'étang de Bois-Vinet.— Forêt de Montmirail. — St-Avit, bruyère des Maisons.
Varie rarement à fleurs blanches.

CAMPANULACÉES

Jasione montana L. — Sables. AR.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou, sablière près du bourg. — Choue, à la Combrayse. — Sargé, sables

Phyteuma spicatum L. — Bois. R.
Bois de la Bellotière, entre Mondoubleau et St-Mars-du-Cor, allée du milieu (Etamines à filets ciliés à la base). — Bois au sud-ouest de la Carrée près de St-Mars-du-Cor.
Les feuilles inférieures sont quelquefois maculées de noir.

Specularia Speculum Alph. DC. — Moissons. RR.
Baillou, moissons à l'ouset des Chauffetières (Pilon).

Campanula Trachelium L. — Lieux frais; bois, haies des prés. AC.
Choue; val du ruisseau de Guériteau, bois de la Bellotière. — Baillou, bois de Roclane et bois de la Talbotière. Etc.
Varie très rarement à fleurs blanches.

Campanula rotundifolia L. — Lieux secs. R.

Haies de la route de Mondoubleau au Temple. — Talus du chemin qui de Cormenon conduit à la route de Vendôme, à la hauteur de l'Etrize. — Cormenon, haies du bois de la Perrière. — St-Mars-du-Cor, haies à la Fontaine-du-Pot et aux Mézières (Abbé Segret). — Beauchêne : bords du chemin qui conduit à Saint-Mars-du-Cor ; talus des haies auprès de la Vove, du Coudray.

M. l'abbé Segret avait trouvé, en 1889, à St-Mars-du-Cor, dans un chemin creux près de Beau-Feu, le *Campanula patula* L. qui n'a pas reparu l'année suivante.

Campanula rapunculus L. — Lieux secs ; pelouses, bords des haies. CC.

VACCINIÉES

Vaccinium Myrtillus L. — Bois élevés. RR.

Le Plessis-Dorin, vers le mllieu du bois Poulard où il s'étend sur un espace de dix mètres carrés environ.

ERICINÉES

Calluna vulgaris Salisb. — Bruyères, bords des champs et des chemins. C.

Varie rarement à fleurs blanches : Vieux chemin de Mondoubleau à Rahay.

Erica tetralix L. — Bruyères et bois humides. AR.

Bois des Grands-Marchais près de St-Mars-du-Cor. — Autour de Beauchêne. — Sargé, bruyère du Chêne-la-Bosse. — Souday ; bois des Bouleaux et près de Tertre-Rouge. — Autour de l'étang de Bois-Vinet. — St-Avit, bruyère des Maisons.

Erica cinerea L. — Bruyères, bois. C.

Erica scoparia L. — Bruyères. RR.

Choue : bruyère de la Clergerie, abondant. (Mme de Terras).

MONOTROPÉES

Monotropa Hypopithys L. var. *hirsuta* Roth. (*Hypopithys multiflora* Scop. Bor.)— Futaies, au pied des arbres. R.
Cormenon, petite futaie au nord-est des Tardivières, — Baillou, bois de la Talbotière. — Sargé, bois des Galouries.

LENTIBULARIÉES

Pinguicula vulgaris L. — Prés marécageux. RR.
Cormenon, prés marécageux au-dessous et à l'ouest de la Maillardière. — Prés au sud-ouest du marais de Conival, sur la limite des communes de Sargé et de Savigny.

Utricularia minor L. — Fossés des terrains marécageux. RR.
Sargé, fossés près de l'Aunaie où je ne l'ai pas vu fleurir.

PRIMULACÉES

Hottonia palustris L. — Fossés, mares. RR.
Mare sur le bord de la route de Mondoubleau au Temple, avant la ferme du Bois-d'Assise. — Beauchêne ; fossés du « fort » non loin du Pavillon.

Primula vulgaris Huds. (*Pr. grandiflora* Lam) — Bois, haies. AR.
Mondoubleau, petit bois proche et au nord de la ferme du Tertre. — Cormenon : val du ruisseau du Parc ; bords du ruisseau de la Tuilerie ; aux Rouaudières. — St-Mars-du-Cor, bois près de Beau-Feu et autour de la Carantinerie. — Abonde dans les bois de Baillou. — Choue, bois d'Assise. — Sargé ; petit bois non loin de Varennes, prés au bord du ruisseau qui vient de la Crousille.
Forme caulescente, RR. — Baillou ; bois des Fourneaux, bois de Roclane.
J'ai trouvé le *Pr. vulgaris* à fleurs d'un rose sale dans un champ non loin de la Borde-Solier (Cormenon). Il croissait au milieu de nombreux individus types.

Primula vulgari-officinalis Gr. (*Pr. variabilis Goup.*). — Bois, avec les parents. R.

Ravin proche et à l'ouest du pont d'Oisnel près de Mondoubleau. — Cormenon, autour de la Borde-Solier. — Bois de Baillou. — Sargé, petit bois non loin de Varennes.

La plante se rapproche tantôt du *Pr. vulgaris*, tantôt du *Pr. officinalis*. J'ai récolté près des Rouaudières (Cormenon) un curieux individu que je rapporte au *Pr. variabilis* ; il ne diffère guère du *Pr. officinalis* que par ses feuilles longuement atténuées à la base comme celles du *Pr. vulgaris*.

Primula officinalis Jacq. — Prés, bois. haies. CC.

Je l'ai vu à Baillou, dans le bois des Fourneaux (autour du sapin), avec des fleurs qui atteignaient 15 à 20 millimètres de diamètre.

A Mondoubleau, dans un verger situé près de l'abreuvoir de la rue Beauvais de Saint-Paul, verger où le *Pr. officinalis* est abondant, la couleur de ses fleurs varie du jaune commençant à prendre une teinte rousse au brun presque noir. Les individus à fleurs ainsi colorées ne diffèrent pas autrement du type. Les fleurs offrant toutes les nuances intermédiaires entre le jaune et le brun très foncé, je crois que notre *Primula* est une simple variété de l'*officinalis*, variété due à la bonne qualité du terrain, plutôt qu'une forme hybride de cette espèce et des primevères cultivées dans les jardins. Si l'on veut le considérer comme un hybride, il faut admettre que l'action du pollen étranger ne s'est manifestée que par un changement dans la coloration des fleurs, ce qui semble bien extraordinaire et contraire aux faits d'hybridation observés entre individus appartenant au genre *Primula*. Une expérience de M. Drevault, jardinier en chef de l'Ecole supérieure de pharmacie, a d'ailleurs montré que la couleur des fleurs pouvait, chez les Primula, varier sous d'autres influences que celle de l'hybridation ; ce botaniste ayant cultivé un *Pr. grandiflora* à fleurs roses, trouvé aux environs de Paris, vit les fleurs revenir au jaune. Le phénomène contraire s'est produit sur un pied de *Pr. elatior* (Bull. Soc. bot. 1882, XVI).

Primula elatiori-officinalis Muret. Gren. (*Pr. media* Peterm.) — Près et bois humides, avec les parents. R.

Val du ruisseau du Parc au-dessus de Cormenon. — Choue, val de la Graine et val du ruisseau de Guériteau.

Les capsules se développent. Elles sont un peu plus courtes que le tube du calice.

Le Pr. elatiori-officinalis, tel que je l'ai vu dans le canton de Mondoubleau, est bien intermédiaire entre ses parents

présumés. Sa pubescence le rapproche d'*officinalis*, ses fleurs, grandes, sont d'un jaune bien moins pâle que dans *elatior*. Il n'est donc pas tout à fait exact de dire, comme M. Franchet, fl. L.-et-Ch. 368, que le *Pr. elatiori officinalis* a simplement l'aspect d'un *Pr. elatior* à calice très ouvert au sommet.

Primula elatior Jacq. — Bois et prés humides ou marécageux. AR.

Mondoubleau, petit bois derrière la ferme du Tertre. — Ravin proche du pont d'Oisnel non loin de Mondoubleau. — Val du ruisseau du Parc au-dessus de Cormenon. — Choue : bois de la Raluère ; abonde dans le val de la Graine et dans le val du ruisseau de Guériteau ; fontaine au-dessous de la Petite-Pilonnière. — Souday ; bois de Glatigny, bois d'Aunes au-dessus de Chalopin, bois des Joncs. — Sargé, bords du ruisseau du Marais. -- Val du Coitron au-dessous d'Oigny.

J'ai observé à Choue, dans le petit bois au dessous et à l'est du Petit-Romeau, un *Pr. elatior* à corolles grandes (25 millimètres de diamètre), planes, d'un jaune pâle, ressemblant beaucoup à celles du *Pr. vulgaris* qui ne croît pas de ce côté. Il appartient sans doute à la forme rencontrée par M. Boreau dans les bois du Nivernais et qu'il me décrit en ces termes dans une lettre du 29 avril 1875 : « Croît dans les bois en nombreux individus sociétaires ; la fleur est large, plane, et d'une couleur soufre uniforme. » Ces caractères conviennent bien à ma plante. — J'ai vu aussi, autour de Guériteau (Choue), le *Pr. elatior* à dents du calice subobtuses, munies d'une petite pointe au-dessous de leur sommet.

Primula vulgari-elatior Gren. (*Pr. digenea* A. Kern.) — Bois frais, avec les parents. RR.

Près de Mondoubleau, ravin proche et à l'ouest du pont d'Oisnel.

J'ai cultivé cette plante ; les capsules se développent souvent (elles égalent le calice ou sont un peu plus longues comme dans *elatior*), mais la plupart des graines avortent, sont mal conformées, et le voisinage de la primevère des jardins peut expliquer le seul cas de fécondité que j'aie constaté. Des graines récoltées sur mon *Pr. vulgari-elatior* cultivé ont en effet produit un individu à corolle d'un rose terne, jaune au milieu. Sa capsule était un peu plus courte que le calice.

La détermination des *Pr. elatiori-officinalis* et *vulgari-elatior* a été vérifiée par M. Grenier, l'un des auteurs de la *Flore de France* Le même, dans sa *Flore Jurassique* (1865), p. 500, décrit les deux hybrides, mais n'indique en

France ni l'un ni l'autre. Je les lui ai signalés en 1874. Kirschleger, fl. Vogéso-rhén., affirme dès 1870, que le *Pr. officinali-elatior* n'est pas rare dans les prairies ombragées des Vosges, mais je pense avoir observé pour la première fois en France le *Pr. vulgari-elatior*.

Lysimachia vulgaris L. — Lieux frais. AC.

Lysimachia nummularia L. — Bois et gazons frais. C.

Lysimachia nemorum L. — Lieux couverts et marécageux. R.

Bords du ruisseau du Parc au-dessous de la Vigne, non loin de Mondoubleau. — Sargé, bords du ruisseau du Marais. — Souday ; bois d'aunes entre Taillefer et Chalopin, bois des Joncs (au bord du ruisseau), bois de Glatigny, petit bois près et au-dessus du moulin de Marigny. — Forêt de Montmirail (lisière méridionale, vers la Bonneterie).

Centunculus minimus L. — Fossés, lieux inondés l'hiver. AC.

Fossés du chemin de Mondoubleau à Baillou. — Vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Bords de l'étang de Bois-Vinet. Etc.

Anagallis arvensis L. — Champs, jardins.

a. *arvensis (An. arvensis* L. *An. phœnicea* Lam. *An. arvensis* L. var. *phœnicea* Gr. God.) CC.

Varie à fleurs d'un blanc rosé, roses, lie de vin : Baillou, ardin potager du château (Pilon). — Fleurs roses, d'un rouge vineux au fond de la corolle : Bords du chemin de Sargé au Temple, avant d'arriver à l'étang des Brosses. — On observe rarement une monstruosité à fleurs vertes.

b. *cærulea* Gr. God. *An. cærulea* Schreb.) RR.

Près de Cormenon, champs au-dessus de la Brousse. — Baillou, champs en face du château.

Anagallis tenella L. — Prés marécageux AR.

Prés marécageux au-dessous et à l'ouest de la Maillardière, non loin de Cormenon. — Choue ; à Guériteau, autour de la Combrayse. — Sargé ; prés autour de la Crousille et de l'Aunaie, marais de Conival. — St-Avit ; prés au nord de l'étang de Bois-Vinet, bruyère des Maisons.

OLÉACÉES

Fraxinus excelsior L. — Lieux frais. C.
Le Lilas (*Lilac vulgaris* Lam.) a été planté dans les bois des Fourneaux (Baillou). Il se trouve aussi dans les haies de la Brousse, près de Cormenon.

Ligustrum vulgare L. — Haies, bois. CC.

APOCYNÉES

Vinca minor L. — Bois, haies. AR.
Choue, bords de la Graine au-dessus du Moulin-Neuf. — Cormenon, talus du chemin qui conduit de la Borde-au-Curé aux Rouaudières. — St-Mars-du-Cor, non loin de la Bigotière. — Baillou ; bois de Roclane (au bord du chemin de Mondoubleau) et bois de la Drouille, haies près du Boulay. — Haies du chemin de Baillou à Souday — Sargé, près des Fosses. — Souday ; bois de Glatigny, bois des Joncs, haies du chemin qui conduit au Plessis-Dorin. — Grands Bois de St-Agil. — Forêt de Montmirail. — St-Avit, autour de la Grande Thiéraie.

GENTIANÉES

Erythræa pulchella Horn. — Champs, bords des chemins. AC.
Chemin de Mondoubleau à Souday. — Bords de l'étang de Bois-Vinet. Etc.

Erythræa Centaurium Pers. — Bois, pelouses. CC.
Varie rarement à fleurs blanches : Baillou, bois de la Talbotière.

Cicendia filiformis Delarbre. — Lieux inondés l'hiver AR.
Bords du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Choue ; champ des Mulots à la ferme du Débarras. — Parc de Baillou, à la mare de la Gaulerie. — Vieux chemin de Cormenon à Sargé vers l'Arsonnière. — Bois des Grands-

Marchais, près de St-Mars-du-Cor.— Beauchêne ; au Pavillon, fossés de la ruelle. — Le Temple, pâtis de la Paillardière (Em. Desvaux) — Grands Bois de St-Agil. — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Cicendia pusilla Griseb. — Lieux humides, inondés l'hiver. R.

Baillou, carrefour de la croix du Boulay. — Vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Parc de Baillou, à la mare de la Gaulerie. — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Chlora perfoliata L. — Pelouses sèches. AR.

Près de Mondoubleau, chemin conduisant de la Maléclèche au petit bois du même nom. — Près de Cormenon, dans la Brousse. — Bords du chemin de Mondoubleau à Souday. — Choue ; champs à la Hérissonnière et autour du Grand-Bouchet. — Bords du chemin de Choue à Souday. — Baillou ; bois des Fourneaux, au dessus de la grotte ; champs au-dessous de Chaillouet, chaintres à la Gautellerie. — Parc de St-Agil. — St-Avit, autour de la Grande-Thiéraie.

Gentiana Pneumonanthe L. — Lieux marécageux. R.

Sargé ; prés marécageux au-dessous du bourg, marais de Conival où Diard l'indique (Cat. Saint-Cal.) — Souday, bois des Mineries près de Tertre- Rouge. — St-Avit, bruyère des Maisons.

Menyanthes trifoliata L. — Prés marécageux. AR.

Val de la Graine. — Val de la Braye. — Prés au-dessus de la Tuilerie de Cormenon.

Limnanthemum Nymphoides Link. Etangs. RR.

Etang de Bois-Vinet.

CONVOLVULACÉES

Convolvulus sepium L. — Haies, buissons, jardins. CC.

Convolvulus arvensis L. — Gazons, jardins. CC.

Cuscuta epithymum L. — AC.

Pilon l'a observé sur le *Cratægus monogyna* Jacq.

BORRAGINÉES

Borrago officinalis L. — Plante de la région méditerranéenne abondamment naturalisée dans les jardins.
Varie rarement à fleurs blanches.

Symphytum officinale L. — Bords des eaux vives CC.

Anchusa arvensis Bieb. (*Lycopsis arvensis* L.).— Lieux vagues. AC.

Lithospermum officinale L. — Bois, buissons. R.
Bords du ruisseau du Parc, au-dessus de Cormenon. — Baillou ; bois de Roclane, chemins verts au nord de la Bouchardière. — Sargé, près des Radrets.

Lithospermum arvense L. — Champs, AC.

Echium vulgare L. — Jachères, lieux vagues.
a. *vulgare*. (*E. vulgare* L. Bor. fl. centr. éd. 3.) CC.
b. *Wierzbickii* (*E. Wierzbickii* Hab. Bor. fl. centr. éd. 3.) AC.

Pulmonaria angustifolia L. Coss. et Germ. fl. Par. éd. 2, 330. Tube de la corolle glabre : *P. longifolia* Bast. Franch. fl. L.-et-Ch. — Bois. R.
Sargé ; bois du Fief-Corbin, bois des Galouries où il est abondant.
Ne diffère du *P. tuberosa* Schrank. Gr. God. (variété du *P. angustifolia* L. suivant Coss. et Germ.) que par un caractère peu important, l'absence de poils au-dessous de la gorge de la corolle.

Myosotis palustris Wither. Coss. et Germ. fl. Par. éd. 2, 326.
a. *palustris* (*M. palustris Auct*). — Rivières, ruisseaux.C.
Varie rarement à fleurs roses ou à fleurs blanches. Le style est plus ou moins allongé, quelquefois court.
b. *strigulosa* (*M. strigulosa* Reich.) — Lieux frais. C.
Fleurs blanches : près des Grands Bois de St-Agil.
Le caractère tiré de la grandeur des fleurs n'a aucune fixité chez le *M. strigulosa*. Ses corolles sont tantôt très petites, tantôt aussi grandes que celles du *M. palustris*, tantôt intermédiaires entre ces dimensions extrêmes.
c. *lingulata* (*M. lingulata* Lehm. Gr. God.) — Fossés, lieux humides. AR.

Cormenon, au gué des Planches. — Choue ; mare sur le bord du vieux chemin de Mondoubleau à St-Agil vers les Aulneaux. — Baillou ; à la croix du Boulay; prairie de Ville-jus. — Souday; mare près de la Fresnaye, val du Coitron un peu au-dessus du moulin de Marigny, au pont du Patouia, au Gué de la Cour, mare sur le bord du chemin qui conduit à Valennes. — Sargé ; bords de la grande prairie au-dessous du bourg, bords de l'étang des Brosses. — Etang de Bois-Vinet.

Myosotis versicolor Pers. — Sables, champs, talus des haies. AC.

Chemin vert de Mondoubleau à Alleray. — Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou, allées du Bois-Neuf. Etc.

Fleurs blanches, puis bleues (*M. dubia* Arrond.) — Haies du chemin de Mondoubleau à Baillou vers le Boulay. — Choue, parc du Grand-Bouchet. — Beauchêne, champs autour du Pavillon.

Myosotis hispida Schlecht. — Lieux vagues, talus des haies. CC.

Forme remarquable : Pédoncules inférieurs plus longs que les calices ; toutes les fleurs roses, devenant bleues par la dessiccation. — Cormenon, au Four-à-Chaux.

Myosotis intermedia Link. — Bois, pelouses, champs, CC.

Cynoglossum officinale L. — Lieux vagues. R.

Près de Cormenon, au bas de la Brousse. — Souday, à la Ciseraye (belle localité). — Le Plessis-Dorin, dans le bourg.

Je le considère comme échappé des jardins.

SOLANÉES

Solanum nigrum L. — Jardins, décombres, lieux vagues.

a. *nigrum (S. nigrum* Auct.) CC.

b. *ochroleucum (S. ochroleucum* Bast.) RR.

Baillou, parc du château (Pilon).

Solanum dulcamara L. — Bords des eaux. C.

On observe rarement dans le voisinage des jardins le *Datura stramonium* L. — Baillou, potager du château.

Hyoscyamus niger L. — Lieux sablonneux, voisinage des habitations. R.

Cormenon, assez abondant à la sablière du Four-à-Chaux où je l'ai toujours vu. — Sables près de Baillou. — Souday, près de Marigny.

VERBASCÉES.

Verbascum Thapsus L. — Bords des haies, jachères. CC.
Observé un individu anomal à calices très grands, à lobes de la corolle petits et verts. Les bractées inférieures étaient brusquement rétrécies en pointe.

Verbascum thapsiforme Schrad. — Lieux incultes. RR.
Diard, cat. St-Cal., 150, l'indique à Sargé, bords de la Braye, où je ne l'ai jamais rencontré.

Verbascum Blattaria L. — Jachères, bords des chemins, bois découverts. C.
Je l'ai vu, à l'état de rejet (la tige ayant été coupée inférieurement), avec des feuilles presque entières.

Verbascum virgatum With (*V. blattarioides* Lam.) — Jachères, bords des chemins. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou : parc du château, bois de Roclane, près des ponts sur la Braye. — Sargé ; sapins des Galouries et au Fief-Corbin.

Verbascum Thaspo-Blattaria (*V; pterocaulon* Franc.) — Lieux incultes, bords des chemins. R.
Baillou ; prés de Forêt où je l'ai vu, en 1879, presque abondant ; jachères autour du Pressoir, bois de la Talbotière.
Observé, sur un rejet, des feuilles non décurrentes. Les pédicelles étaient allongés.

Verbascum Thapso-floccosum Gr. God. (*V. Godroni* Bor. Franch.) — Bords des chemins. R.
Bords du vieux chemin de Cormenon au Gravier. — Baillou, pré de Forêt. — Sargé, chemins verts autour de Varennes.

Verbascum Thapso-Lychnitis Mert. et Koch. (*V. spurium* Koch. Franch.) — Lieux incultes. R.
Cormenon, au Four-à-Chaux et au-dessous de la Maillardière. -- Baillou ; près de Roclane, près de la Talbotière.

Verbascum Thapso-nigrum Schiede. (*V. collinum* Schrad Franch.) — Bords des chemins, jachères. RR.

Bords du vieux chemin de Cormenon au Gravier.

Poils des étamines blancs sur la face extérieure du filet, presque tous violets sur la face intérieure.

J'ai observé le *V. auritum* Franch. dans les champs à droite du vieux chemin cité. Calice petit. — M. Franchet considère son *V. auritum* comme issu des mêmes parents que le *V. collinum* Schrad., les différences qui les séparent seraient dues probablement à l'interversion du rôle des ascendants. Ainsi le *V. collinum* étant le produit du *nigrum* fécondé par le *Thapsus*, le *V. auritum* résulterait de la fécondation du *Thapsus* par le *nigrum*. Cette explication, que le savant auteur de la *Flore de Loir-et-Cher* donne d'ailleurs sous une forme dubitative, ne satisfera pas tous les botanistes. J'ai entendu l'année dernière, après une séance de la Société botanique, l'un des membres les plus autorisés de l'Institut, déclarer que de très nombreuses expériences lui permettaient d'affirmer que l'interversion dans le rôle des parents n'est d'aucun effet sur les produits hybrides ; l'individu A fécondé par l'individu B et l'individu B fécondé par l'individu A donneront invariablement naissance à la même forme qui peut être, quel que soit le rôle des parents, voisine de A ou voisine de B. Si l'on opère sur deux autres individus appartenant aux mêmes espèces, le produit ne sera plus identique ; on obtiendra une deuxième forme différente de la première. La diversité des formes hybrides tiendrait donc uniquement à la nature intime des individus. Je rapporte cette conversation qui m'a paru intéressante, et dont j'ai soigneusement noté les détails, sans vouloir d'ailleurs en tirer une autre conclusion que celle-ci : la question des hybrides demeure assez obscure et l'opinion des botanistes sur ce point délicat est loin d'être unanime.

Verbascum floccosum Waldst. et Kit. — Bords des chemins. AC.

Vieux chemin de Cormenon au Gravier. — Baillou, autour du bourg. — Souday, vers Planche-Hubert. Etc.

Verbascum Lychnitis L. — Bords des chemins, lieux incultes. AR.

Fleurs jaunes.— Cormenon, au Four-à-chaux. — Baillou : à Roclane, à la Talbotière. — Bords du chemin de Baillou à Souday.

Fleurs blanches. — Baillou ; bois des Fourneaux, à Roclane et près de la Craudière où cette variété est abondante.

Filets des étamines glabres : var. *gymnostemon*. Franch. ess. Verb. 154. — Près de la vieille tour de Mondoubleau.— Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou à la côte de la Maladrie (M. Halgrin, médecin à Mondoubleau, a récolté cette variété au même lieu en 1839, v. s.). — Cormenon, sables des Rouaudières. — Dans notre canton les fleurs de la var. *gymnostemon* sont toujours blanches.

Verbascum nigrum L. — Lieux frais ; prés, bords des chemins. R.

Val de la Graine à Mondoubleau et à Cormenon. — Prés au-dessus du Pont d'Oisnel, près de Mondoubleau.

Je l'ai observé à feuilles supérieures brusquement acuminées en pointe oblique. Non *Verb. nigro-floccosum* Koch.

Verbascum floccoso-Lychnitis (*V. Euryale* Franch.) — Bords des chemins. RR.

Baillou, chemin qui de Roclane conduit à la Vallée. Pédicelles plus longs que le calice.

J'ai observé au même lieu le *V. Nisus* Franch., hybride présumé des *V. Lychnitis* et *floccosum*. Il avait les poils des étamines blancs.

Verbascum nigro-floccosum (*V. Schottianum* Schrad. Franch.) — Bords des chemins. R.

Route de Mondoubleau à Sargé, entre le Charme et le Gravier. — Vieux chemin de Cormenon au Gravier où il n'est pas rare.

J'ai récolté, entre Cormenon et le Gravier, le *V. Wirtgeni* Franch., hybride probable, suivant M. Franchet, des *V. floccosum* et *nigrum*.

SCROPHULARIACÉES

Scrophularia nodosa L. — Bois frais. AC.

Bois de la Maladrie, près de Mondoubleau. — Baillou, bois de Roclane. — Choue ; C. autour du Grand-Bouchet.

Scrophularia aquatica L. — Bords des eaux. CC.

Je l'ai observé à fleurs vertes.

Antirrhinum Orontium L. – Moissons, jachères. AC.

Linaria spuria Mill. — Champs. R.

Baillou ; champs en face du château, champs au-dessous du Chaillouet. — Choue, autour de la Fosse.

Linaria Cymbalaria Mill. — Murs. R.
Mondoubleau ; murs des maisons, des jardins, à l'ouest du carrefour de l'Ormeau. — Plante méridionale apportée de Poitiers vers 1868.

Linaria Elatine Desf. — Champs, lieux vagues. CC.

Linaria vulgaris Mœnch.— Bords des haies, jachères. C.

Linaria striata DC. — Terrains sablonneux ; bruyères, haies. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou, haies près de la Challerie. — Sargé ; au Fief-Corbin, près de l'étang des Brosses, bruyère du Chêne-la-Bosse. — Haies près de l'étang de Bois-Vinet.
Je l'ai récolté, aux Rouaudières, à fleurs blanches, sans stries. La plante était d'un vert jaunâtre.

Linaria striato-vulgaris Crépin (*L. ochroleuca* Bréb. *L. striata* var. *grandiflora* Godr.) — Terrains sablonneux, RR.
Sargé, haies au bord de l'étang des Brosses.

Linaria minor Desf. — Champs. AC.

Veronica Chamædrys L. — Pelouses, prés, bois. CC.

Veronica Beccabunga L. — Eaux peu profondes. C.

Veronica Anagallis L. — Eaux peu profondes.
a. *Anagallis*. Plante entièrement glabre. AC.
Je l'ai récolté près de Sargé avec des grappes alternes. Un seul individu.
b. *pseudo-anagalloides* Gren. (*V. anagalloides* Mich. Em. Martin, cat. Romor., non Guss.) Pédicelles glanduleux. RR.
Baillou, aux ponts sur la Braye.

Veronica scutellata L. — Lieux humides ou marécageux.
a. *scutellata*. Plante glabre. R.
Mare sur le bord du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Baillou, près de Roclane et à la croix du Boulay. — Sargé ; à l'étang des Brosses, prés autour de la Crousille et près des Fosses. — Souday, mare sur le bord du chemin qui conduit à Planche-Hubert (Pilon). — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

b. *parmulaira* (*V. parmularia* Poit. et T[illegible]p.) Plante couverte de poils glanduleux. RR.
Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Veronica montana L. — Bois frais. AR.
Près de Mondoubleau, dans le ravin qui coupe de l'est à l'ouest le bois de la Maladrie. — Mondoubleau, petit bois proche et au nord de la ferme du Tertre. — Bois voisin du ruisseau du Parc, au-dessus de Cormenon. — Bois au-dessus de la Tuilerie de Cormenon. — Choue, bois de Guériteau. — Baillou, bois de Roclane (bords de l'allée du bas). — Souday ; bois des Bouleaux, de Glatigny, des Joncs.

Veronica officinalis L. — Bois, haies. C.

Veronica serpillifolia L. — Gazons, prés. CC.

Veronica arvensis L. — Champs, gazons. AC.
Cormenon, abondant aux Rouaudières. Etc.

Veronica acinifolia L. — Lieux sablonneux. R.
Mondoubleau, champs au-dessous du Moulin-Neuf. — Cormenon, moissons aux Rouaudières. — Choue ; à la Fosse, champ du Pavillon. — Allées du parc de Baillou derrière le château. — Sargé ; non loin de la gare petit chemin conduisant à la prairie. — Souday, parc de la Cour.
Je l'ai trouvé avec les divisions du calice un peu plus longues que la capsule ; habituellement, c'est le contraire qu'on observe. Tige allongée, croissait à l'ombre.

Veronica agrestis L. — Jardins.
a. *agrestis* (*V. agrestis* L. Gr. God. *V. pulchella* Bast.) RR.
Mondoubleau, jardins à l'ouest de la ville.
b. *polita* (*V. polita* Fr. *V. didyma* Gr. God.) C.

Veronica hederæfolia L. — Champs. jardins, bois. CC.

Limosella aquatica L. — Bords des étangs, lieux humides. RR.
Etang de Bois-Vinet. — Forêt de Montmirail (Abbé Segret).

Digitalis purpurea L. — Bois, bords des haies. C.
Je l'ai vu à fleurs d'un rose très pâle.

Euphrasia officinalis L. — Gazons, prés secs.
a. *officinalis* (*E. officinalis* L. Gr. Godr. *E. officinalis* var. *pratensis* Koch.) R.

Ravin à l'ouest de la fosse de la Bonde près de Mondoubleau. — Val du ruisseau du Parc au dessus de Cormenon. — Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou. — Choue, près de Monvalet. — Baillou, val du ruisseau de Petite-Eau. — Souday, prés secs. — Sargé, prés au-dessous des Pâtis.
b. *nemorosa (E. nemorosa* Pers. Gr. God.) CC.

Euphrasia Odontites L. — Moissons. C.

Eufragia viscosa Benth. — Terrains sablonneux. R.
Moissons aux Rouaudières (Abbé Noffray). — Saint-Mars-du-Cor, autour des Mézières (Abbé Segret). — Rives de l'étang de Bois-Vinet.

Rhinantus crista-galli L. — Prés, pelouses. CC.

Pedicularis palustris L. — Prés humides ou marécageux. AC.

Pedicularis silvatica L. — Lieux secs et incultes. AC.

Melampyrum arvense L. — Moissons, chaintres. AC.

Melampyrum pratense L. — Bois. CC.

OROBANCHÉES

Orobanche rapum Thuill. — Sur le *Sarothamnus vulgaris*. C.

Orobanche cruenta Bertol.— Sur plusieurs légumineuses. AC.

Orobanche Picridis Vauch. — Champs. RR.
Près de Cormenon ; champ au-dessus de la Brousse, sur le *Picris hieracioides*. — Lefrou, cat. L.-et-Ch., l'indique à Baillou où je ne l'ai pas rencontré.
Les étamines ne sont pas insérées plus haut que dans l'*Or. minor* auquel M. Franchet, fl. L.-et-Ch., réunit l'*Or. Picridis*.

Orobanche minor Sutton.— Habituellement parasite sur le *Trifolium pratense*. C.
Aug. Pilon l'a vu, dans le parc de Baillou, sur le *Geranium Robertianum*, le *Cirsium lanceolatum*, le *Crepis diffusa*.

On l'observe très rarement jaune dans toutes ses parties : Or. *minor* var. *flavescens* Gr. God. (*Or unicolor* Bor.) — Près de Baillou, sur le *Trifolium pratense*. 1863.

LABIÉES

Mentha rotundifolia L. — Lieux frais et incultes. C.

Mentha aquatica L. — Bords des eaux, ruisseaux. CC.

Mentha sativa L. — (Hybride du *M. aquatica* et du *M. arvensis ?*) — Bords des eaux. R.
Mondoubleau ; Pré-Barré, bords du ruisseau. — Choue. St-Mars-du-Cor, aux Grands-Marchais. — Baillou, près de Roclane.— Bords du chemin de St-Agil à la Fontenelle. — A l'étang de Bois-Vinet.

Mentha arvensis L. — Lieux frais ; bords des ruisseaux et des chemins, champs. R.
Baillou, ruisseau de Petite-Eau. — Souday, environs de la Cour. — Chemin de St-Agil à la Fontenelle. — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Mentha Wohlwertiana Schultz (Hybride du *M. rotundifolia* et du *M. arvensis ?*) — Ruisseaux. RR.
Baillou ; bords du ruisseau de Petite-Eau, avec les parents présumés (Pilon, 1864).
Cette plante a été nommée par M. Boreau.

Mentha Pulegium L. — Lieux inondés l'hiver ; fossés, bords des chemins et des champs. CC.
Varie rarement à fleurs blanches.

Lycopus europæus L. — Bords des eaux, fossés, AC.

Origanum vulgare L. — Lieux incultes, bords des chemins et des champs. CC.
a. *vulgare* (*Or. vulgare* L. Bor. fl. centr. éd. 3).
b. *megastachyum (Or. megastachyum* Link. Bor. fl. centr. éd. 3).
Varie rarement à fleurs blanches et à bractées vertes. — Baillou, parc du château. — Sargé, près de Montmarin.

Thymus Serpyllum L. — Gazons, bords des chemins et des champs.

a. *Serpyllum (Th. Serpyllum* L. Gr. God.). CC.
b. *Chamædrys (Th Chamædrys* Fr. Gr. God.). AC.
Baillou, parc. — Sargé, au Fief-Corbin. Etc.

Calamintha menthæfolia Host.— Bords des chemins. RR.
Dans le bourg de Baillou.— Sargé, près du moulin de Comes.

Calamintha Acinos Clairv. — Jachères, champs. AC.

Calamintha Clinopodium Benth. — Lieux secs ; bords des haies, pelouses. C.
On rencontre quelques pieds de *Melissa officinalis* L. autour du bourg de Baillou.

Salvia pratensis L. — Lieux secs et incultes. R.
Sargé, talus du chemin qui conduit au Temple (vers Rotsans) et près de la Corneillerie. — Souday, autour de la Bergerie.

Nepeta Cataria L. — Voisinage des habitations. RR.
Cormenon, assez abondant à la ferme du Boulay. — Sargé, près de Malitourne. — Echappé des jardins.

Glechoma hederacea L.— Lieux frais; pelouses, bois. CC.

Lamium amplexicaule L. — Jardins, champs. R.
Cormenon; jardin du presbytère, aux Rouaudières. — Mondoubleau, jardins. — Baillou, jardins.
Les corolles des premières fleurs sont quelquefois très petites et fermées au sommet.

Lamium hybridum Vill. — Jardins, champs. AR.
Mondoubleau, jardins de la ville et à Rocheux. — Jardin du Foulon près de Mondoubleau. — Cormenon ; jardins, aux Rouaudières.— Choue, potager du Grand-Bouchet.— Baillou, potager du château. — Oigny, aux Gillardières.
La *Flore de France* place le *L. hybridum* dans la section *Lamiopsis* Dumort. caractérisée par le tube de la corolle dépourvu intérieurement d'un anneau de poils et par les anthères barbues. Or le *L. hybridum* de Mondoubleau offre un anneau de poils à l'intérieur du tube de sa corolle. M. Grenier, à qui je l'avais envoyé, m'écrivait le 8 mai 1870 : « J'ai examiné votre *Lamium* qui est certainement l'*hybridum* Vill. malgré la couronne de poils de la base du tube de la corolle. Cela prouve que le caractère de section que nous avons employé n'est pas constant. » Villars d'ailleurs, (fl. Dauph.) ne dit point si le tube de la corolle est glabre ou

muni intérieurement d'un anneau de poils; Koch, Boreau, Cosson et Germain, Franchet, Lloyd, dans leurs flores, font de l'absence de cet anneau l'un des caractères du *L. hybridum;* Gustave et Héribaud (fl. Auvergne) disent avec raison « tube ordinairement glabre en dedans. »

J'ajouterai que les caractères tirés de la longueur de la corolle relativement au calice (Gr. God.) et du lobe moyen de sa lèvre inférieure canaliculé ou plan (Coss. et Germ.), pour aider à la distinction spécifique du *L. hybridum* et du *L. purpureum*, me semblent aussi défectueux. Mais on reconnaîtra toujours le premier à ses feuilles florales ovales-triangulaires, décurrentes sur le pétiole, incisées, crénelées. Kirschleger (fl. Vogéso--rhén.) me semble commettre une erreur lorqu'il considère le *L. hybridum* Vill. comme un hybride des *L. purpureum* et *amplexicaule.* J'ai vu le *L. hybridum* abonder dans certains jardins où le *L. amplexicaule* était nul ou très rare.

Lamium purpureum L.— Jardins, haies, décombres. CC. Varie rarement à fleurs blanches.

Lamium album L. — Jardins. R.
Mondoubleau, haies des jardins voisins du cimetière. — Chemin vert en haut du champ de foire de Mondoubleau. — Choue, jardins au nord du bourg. — Echappé des jardins.

Lamium Galeobdolon Crantz.— Lieux frais; prés, bois, haies. AC.

Leonurus Cardiaca L. — Voisinage des habitations. RR.
Mondoubleau, au pied de la vieille tour (reste des cultures du moyen-âge). — Observé autrefois à Baillou, dans le bois de la Taille, où je ne le retrouve plus.

Galeopsis angustifolia Ehrh. — Jachères, champs après la moisson. CC.

Galeopsis Tetrahit L. — Lieux frais; bois, haies. C.
Varie :
1° à fleurs grandes mêlées de blanc, de jaunâtre et de violet (*G. versicolor* Curt.) — Baillou; bords de la Braye, bois de Roclane et de la Talbotière.
2° à fleurs jaunâtres (*G. sulfurea* Jord.) — Sargé, haies voisines du chemin qui conduit à l'Aunaie.
Calices verts ou d'un rouge vineux.

Stachys germanica L. — Lieux incultes, jachères. R.
Chemin vert en haut du champ de foire de Mondoubleau. — Mondoubleau ; sur la Levée, ravin à l'ouest et au-dessous du Tertre, chemin qui conduit de la route de Vendôme à la route de Cloyes. — Champs sur le bord du chemin de Mondoubleau à St-Mars-du-Cor. — Baillou, près de la sablière du Pont-du-Bas. — Cormenon, bois au-dessus de la Tuilerie.

Stachys alpina L. — Bois. AC.
Mondoubleau, sur la Levée. — Bois de Baillou. Etc.
Diard n'a pas observé cette espèce aux environs de St-Calais.

Stachys silvatica L. — Lieux frais ; bois, décombres. C.

Stachys palustris L. — Bords des eaux. C.

Stachys arvensis L. — Champs, jardins. AR.
Mondoubleau : jardins de la ville, de Rocheux ; champs au-dessus des Grands-Moulins. — Cormenon, aux Rouaudières. — Choue ; autour du Grand-Bouchet, champs de l'Epinay. — Baillou, champs. AC. (Pilon). — Beauchêne, jardins. — Souday ; champs autour de Tertre-Rouge, de Taillefer.

Betonica officinalis L. — Bois, bords des haies. C.
Varie rarement à fleurs blanches. — Baillou, bois de la Talbotière.

Ballota fœtida Lam. — Talus des haies, décombres. C.

Marrubium vulgare L. — Talus des haies. C.

Melittis Melissophyllum L. — Bois. C.
Diard, cat. St-Cal. 148, indique à Sargé, bois du Fief-Corbin, et M. Nouel a trouvé à Azay, en dehors de nos limites, le *M. Melissophyllum* à fleurs entièrement rouges ou roses ; je n'ai vu cette belle plante qu'avec une corolle blanche largement tachée de pourpre.

Scutellaria galericulata L. — Bords des eaux. AC.

Scutellaria minor L. — Lieux inondés l'hiver, bords des fossés. AR.
Cormenon, à l'étang des Rouaudières. — Baillou, à la croix de Boulay et broussailles sur le bord du chemin de Mondoubleau. — Bords de la route de Mondoubleau à la Chapelle-Vicomtesse, près des Souches. — Beauchêne, fossés aux Turnes. — Fossés du chemin de Beauchêne au Temple. — Grands Bois de St-Agil. — Bords de l'étang de Bois-Vinet. — Forêt de Montmirail. — St-Avit, bruyère des Maisons.

Brunella vulgaris Mœnch. — Gazons.
a. *vulgaris (Br. vulgaris* Mœnch. Gr. God.) CC. — Corolle dépassant à peine le calice : *Br. parviflora* Poir. Baillou, parc.
b. *alba (Br. alba* Pall. Gr. God.). C.

Ajuga reptans L. — Prés, bois. CC.
Varie rarement à fleurs blanches ou d'un rose violet. Je l'ai observé dans le parc de Baillou à fleurs d'un rose vineux, les tiges étaient pourpres, les feuilles supérieures lavées de la même couleur.
Les stolons manquent quelquefois.

Ajuga Chamæpitys Schreb. — Champs. RR.
Baillou, sablière du Pont-du-Bas et champs autour de la Doucière.

Teucrium Scorodonia L. — Bois. C.

VERBÉNACÉES

Verbena officinalis L. — Bords des champs, des chemins. CC.

PLANTAGINÉES

Plantago major L. — Bords des chemins et des champs, décombres. CC.

Plantago media L. — Gazons. C.

Plantago coronopus L. — Bords des chemins. AC.

Plantago lanceolata L. — Gazons, bords des chemins. C.

Littorella lacustris L. — Bords des étangs. RR.
A l'étang de Bois-Vinet.

AMARANTACÉES

Amarantus Blitum L. (*A. ascendens* Lois.). — Rues, décombres. RR.
Mondoubleau, rue des Béguines où il est assez abondant.

Amarantus silvestris Desf. — Jardins, décombres. R.

Mondoubleau. — Baillou, potager du château. — Je manque de renseignements sur cette espèce qui ne sort guère des jardins.

SALSOLACÉES

Atriplex hastata L. — Jardins, décombres. C.

Atriplex patula L. — Jardins, décombres. C.

Chenopodium polyspermum L. -- Bois, broussailles.
a. *polyspermum (Ch. polyspermum* L.) RR.
Bords du ruisseau du Parc au-dessus de Cormenon. — Baillou, bois de Roclane.
b. *acutifolium (Ch. acutifolium* Sm.) R.
Choue, bois de Guériteau et potager du Grand-Bouchet. — Baillou ; parc du château, au pont sur la Braye, bois de Roclane et de la Talbotière. — Souday, près de la Cour. — Chemin de St-Agil à la Fontenelle. — St-Avit, dans le bourg.

Chenopodium vulvaria L. - Au pied des murs. AC.

Chenopodium album L. — Champs, décombres. CC.

Chenopodium hybridum L. — Voisinage des habitations. R.
Cormenon, jardin du presbytère. — Baillou, potager du château. — Sargé, près du bourg et parc du Fief-Corbin.

Chenopodium urbicum L. var. *intermedium* Gr. God. (*Ch. intermedium* Koch.) — Cours des fermes, décombres. RR.
Baillou, cour des Mussuères où il est assez abondant (Pilon).

Chenopodium murale L.— Bords des rues, décombres. R.
Mondoubleau, particulièrement dans la rue Beauvais-de-St-Paul. — Choue, dans le bourg.

Chenopodium bonus-Henricus L.— Bords des rues. RR.
Choue, dans le bourg.

Chenopodium rubrum L. var. *crassifolium* Moq. Tand. (*Ch. crassifolium* Hornem.).— Bords vaseux des étangs. RR.
Bords du grand étang de Bois-Vinet, à l'extrémité ouest.
Calice fructifère rouge, un peu charnu, graines verticales. Le *Ch. crassifolium* établit bien le passage entre le genre *Chenopodium* et le genre *Blitum*, on peut indifféremment le placer dans le premier ou dans le second.

POLYGONÉES

Rumex maritimus L. — Bords des étangs. RR.
Bords du grand étang de Bois-Vinet à l'extrémité ouest.

Rumex pulcher L. — Gazons secs. R.
Mondoubleau, butte de la tour et, près de la ville, autour du moulin du Foulon.— Cormenon ; aux Rouaudières et près de la Tuilerie. — Baillou, parc. — Sargé ; à la Crousille, aux Virliblés. — Souday ; chemin de Glatigny à la Cour.

Rumex obtusifolius L. — Lieux frais. CC.

Rumex conglomeratus Murr. — Bords des eaux. C.

Rumex sanguineus L. var. *nemorosus (R. nemorosus* Schrad.) — Bois frais. AR.
Cormenon : autour de l'étang des Rouaudières, petit bois au-dessus de la Tuilerie. — Choue ; bois de Guériteau, parc du Grand-Bouchet. — Baillou, bois de Roclane et de la Talbotière. — Sargé, à la Crousille. — Souday ; parc de Glatigny ; à la Cour et dans le bois des Joncs. — St-Avit, autour de la Grande-Thiéraie.

Rumex crispus L. — Prés, bois, lieux vagues. C.

Rumex hydrolapathum Huds. — Eaux peu profondes. R.
Dans la Braye.

Rumex Acetosa L. — Prés, gazons secs. C.

Rumex Acetosella L. — Lieux secs, prés, jachères. C.

Polygonum amphibium L. — Rivières, étangs. Çà et là.
Dans la Braye. — A l'étang de Bois-Vinet. Etc.

Polygonum lapathifolium L. — Bords des étangs, des rivières ; décombres. R.
Mondoubleau ; abonde en 1889 sur un tas de terre, de décombres, amené dans un pré situé sur le bord de la route de St-Agil. — Baillou, au premier pont sur la Braye. — Bords de l'étang de Bois-Vinet, dans le voisinage de la bonde. — Var. *nodosum (P. nodosum* Pers.) : près de Mondoubleau ; à Baillou, dans le parc et au pont sur la Braye.
Nombreux points glanduleux à la face inférieure des feuilles, dans le type et dans la var. *nodosum*.

Polygonum Persicaria L. — Lieux frais, jardins, décombres, fossés. CC.

Polygonum mite Schrank. — Bords des eaux, fossés. R. Cormenon ; val de la Graine à peu près en face de la Renardière (quelques glandes sur le périgone). — Baillou, au pont sur la Braye. — Souday, au gué de la cour.
J'ai observé à Baillou un *Polygonum* remarquable, hybride peut-être de l'*hydropiper* et du *mite* : gaînes velues, longuement ciliées ; grappes dressées, assez fournies ; akènes luisants, saveur herbacée (*P. mite*) ; divisions du périgone munies de points glanduleux (*P. hydropiper*).

Polygonum minus Huds. — Lieux vaseux. RR.
Etang de Bois-Vinet, à l'est.

Polygonum hydropiper L. — Bords des eaux. CC.
Les feuilles offrent, surtout à leur extrémité supérieure, de nombreux points transparents. Aucune flore, à ma connaissance, ne signale ce caractère.
Varie rarement à fleurs verdâtres ou blanches.

Polygonum aviculare L. — Bords des chemins, cours, rues. CC.
Tiges quelquefois dressées : *P. aviculare* var. *erectum* Roth. *P. Monspeliense* Pers.

Polygonum Convolvulus L. — Champs. C.

Polygonum dumetorum L. — Haies. R.
Vieux chemin de Cormenon au Gravier. — Cormenon, haies près et à l'ouest des Rouaudières. — Haies de la route de Mondoubleau à Sargé non loin des Pâtis. — Sargé, vieux chemin de Savigny.

DAPHNOIDÉES

Daphne Laureola L. — Bois, haies. AR.
Petit bois de la Malécléche, près de Mondoubleau. — Cormenon, haies autour des Rouaudières. — Haies dans le voisinage du vieux chemin de Cormenon à Sargé. — Baillou ; parc du château, bois de la Taille, de Roclane, de la Drouille. Vieux chemin de Mondoubleau à Valennes. — Choue, haies du chemin qui de la Conardière conduit à la Haissière.

— Sargé ; autour de la Bougrerie, près du Gravier ; haies de la route qui conduit de Montmarin à Epuisay. — Souday ; bois de Glatigny, environs de la Cour.

Passerina annua Spreng. — Champs après la moisson, lieux incultes. R.
Baillou ; champs entre Boisvert et la Bretonnière (Pilon), autour de la Talbotiére. — Choue ; allées du Parc du Grand-Bouchet et des bois de la Péchardière.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia helioscopia L. — Jardins. CC.

Euphorbia dulcis L. — Bois frais, bords des ruisseaux. AC.
Mondoubleau, ravin près et au-dessous du Tertre. — Val du ruisseau du Parc au-dessus du pont d'Oisnel, près de Mondoubleau. — Val de la Graine. — Baillou, bois de la Talbotière. Etc.
Les glandes de l'involucre calyciforme sont verdâtres ou d'un rouge vineux.

Euphorbia Cyparissias L. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudiéres. — Sargé, au Fief-Corbin. — Souday, autour de Glatigny. — Environs d'Oigny. — St-Avit, autour de la Grande-Thiéraie.
Il est quelquefois défiguré et arrêté dans son développement par la présence d'un champignon parasite, l'*Æcidium Euphorbiarum*. DC.

Euphorbia exigua L. — Champs. CC.

Euphorbia Peplus L. — Jardins. C.

Euphorbia amygdaloides L. — Broussailles. bois. CC.
On rencontre quelquefois l'*Euph. Lathyris* L. dans le voisinage des habitations.

Mercurialis perennis L. — Lieux frais ; bois, broussailles. AC.
Bois de la Maladrie, près de Mondoubleau. — Bords du ruisseau du Parc au-dessus de Cormenon. — Baillou, bois des Fourneaux où il abonde. Etc.

Mercurialis annua L. — Jardins, décombres. CC.
Aug. Pilon a observé plusieurs individus qui portaient quelques capsules mêlées aux fleurs mâles.
Le *Buxus sempervirens* L. existait autrefois à la sablière du Four-à-chaux (Cormenon), il en a disparu par suite des travaux pour l'extraction du sable.

URTICÉES

Ulmus campestris L. — Bois, bords des champs. CC.
L'écorce est subéreuse ou non sur le même individu.
L'*Ulmus montana* Sm. et l'*U. effusa* Willd. sont quelquefois plantés. J'ai observé le premier à Baillou, autour de Courtai, le second à Cormenon, dans le voisinage de la Borde-Solier.

Urtica urens L. — Autour des habitations. C.

Urtica dioica L. — Autour des habitations, quelquefois dans les bois. CC.

Parietaria officinalis L. var. *diffusa* Wedd. (*Par. diffusa* Mert. et Koch.).— Vieux murs. R.
Baillou, dans le bourg et aux Chauffetières. — Sargé, murs.

Humulus Lupulus L. — Bords des eaux, haies des prés frais. C.

CUPULIFÈRES

Fagus silvatica L. — Bois. R.
Grands Bois de St-Agil. — Forêt de Montmirail.

Castanea vulgaris Lam. — Bois. Souvent planté. C.
A Cormenon, le châtaignier dit « de Perrière » mesure 7 m. 60 de circonférence à un mètre du sol.

Quercus sessiliflora Sm. — Bois, autour des champs. Moins répandu que le suivant.
Environs de Mondoubleau. — Baillou, bois Neuf. Etc.

Quercus pedunculata Ehrh. — Bois, autour des champs. CC.

La *trogne*, ou têtard, de Boursay, près de nos limites, est un chêne creux qui mesure, à 70 cent. du sol, 9 m. 70 de circonférence.

Corylus Avellana L. — Haies, bois. CC.

Carpinus Betulus L. — Haies, bois. CC.

SALICINÉES

Salix alba L. — Lieux frais, bords des eaux. C.
On le laisse rarement grandir, c'est sous l'aspect de têtards qu'il est le plus fréquent.

Salix triandra L. — Lieux frais, bords des eaux. RR.
Près de Mondoubleau, dans le Pré-Barré et au bord de la fosse de la Bonde dans les prés du Foulon.
Je n'ai vu que des individus mâles.

Salix cinerea L. — Haies, bois. CC.

Salix caprea L. — Haies, bois. R.
Bois de la Maladrie, près de Mondoubleau. — Cormenon, bois à l'est et non loin du bourg. — Baillou : chemins verts autour de la Bouchardiére ; bords du chemin de Mondoubleau à la côte de la Talbotière ; bois de la Talbotière.

Salix aurita L. — Bois humides. RR.
Forêt de Montmirail.

Populus Tremula L. — Bois, autour des champs. Çà et là.
Le *Populus alba* L., le *P. nigra* L. et le *P. pyramidalis* Roz. sont, le dernier surtout, fréquemment plantés.

BÉTULACÉES

Betula alba L. — Bois humides. C.

Alnus glutinosa Gært. L. — Lieux humides ; prés bois, CC.

CONIFÈRES

Juniperus communis L. — Bruyères, landes. RR.
Baillou, bruyère du Chaillouet où il est abondant. — Sargé, coteaux bordant le val du ruisseau du Marais.
Le *Pinus silvestris* L. et le *P. maritima* Lam. sont fréquemment plantés. On cultive d'autres conifères dans les parcs et dans les bois (*Larix Europæa* DC. Beauchêne, bois des Grands-Marchais).

ALISMACÉES

Alisma Plantago L. — Bords des eaux, lieux inondés. CC.
La forme à feuilles longuement atténuées à la base constitue *l'Al. lanceolatum* Reich.

Alisma ranunculoides L. — Lieux marécageux. R.
Choue ; mare sur le bord du vieux chemin de Mondoubleau à St-Agil vers les Aulneaux (tiges couchées radicantes : *Al. repens* Cav. DC.). — Près de Sargé, vers l'Aunaie. — Bords de l'étang de Bois-Vinet. — Forêt de Montmirail.

Alisma natans L. — Eaux peu profondes. AR.
Dans la Graine. — Mare sur le bord du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Cormenon, mare dans un champ situé à gauche du chemin qui, de la bruyère des Rouaudières, conduit au Four-à-chaux. — Sargé, aux Fosses (Em. Desvaux) où je l'ai retrouvé. — Forêt de Montmirail.

Alisma Damasonium L. — Lieux vaseux. RR.
Bords du petit étang de Bois-Vinet. Un seul individu.— On pourra retrouver cette espèce dans le canton, le docteur Rendu me l'a indiquée près de nos limites.
Sagittaria sagittæfolia L. — Eaux peu profondes. AC.

BUTOMÉES

Butomus umbellatus L. — Eaux peu profondes. RR.
Baillou, au premier pont sur la Braye. — Sargé ; dans la Braye, près du bourg.

COLCHICACÉES

Colchicum autumnale L. — Prés secs. C.

LILIACÉES

Ornithogalum pyrenaicum L. — Prés, bords des ruisseaux. R.
Près de Cormenon, au bas de la Brousse. — Cormenon, vallée des Guigniers. — Entre Baillou et Sargé vers l'Espérance.

Ornithogalum umbellatum L. — Champs. RR.
Cormenon, grand champ près et au sud des Rouaudières.

Allium vineale L. — Moissons, lieux vagues. AC.

Allium ursinum L. — Lieux marécageux ; bois; prés. R.
Souday ; val du Coitron : bois d'aunes au-dessus de Chalopin, haies des prés à la hauteur de Laudinière ; bords du ruisseau de la Grande-Vallée.— Je l'ai planté à Baillou, bois des Fourneaux, au-dessous de la grotte.

Allium oleraceum L. Champs.— RR.
Baillou (Pilon).

Endymion nutans Dum. — Bois, haies, prés. AC.
Broussailles sur la Levée près de Mondoubleau.— Choue, val du ruisseau de Guériteau. — Baillou, bois où il abonde. Etc.
Varie rarement à fleurs blanches. — Baillou, bois des Fourneaux, fleurs rosées.

Muscari comosum. Mill. — Champs. AC.
Cormenon, autour des Rouaudières. — Choue, C. autour du Grand-Bouchet. Etc.

SMILACÉES

Paris quadrifolia L.— Bois humides ou marécageux. R.
Choue ; bois de Guériteau dans le voisinage du ruisseau, petit bois proche et au nord-est du Petit-Romeau où il est très abondant. — Souday ; bois de Glatigny, aunaie sur le bord du Coitron entre Taillefer et Chalopin,

Polygonatum multiflorum All. — Bois. C.

Convallaria majalis L. — Bois. R.
Choue, bois d'Assise.— Sargé ; bois de la Corneillerie, des Galouries (sur le plateau), parc du Fief-Corbin. — Souday, bois de Glatigny.

Ruscus aculeatus L. — Bords des haies, bois. R.
Baillou, champ autour de la ferme de la Forêt. — St-Mars-du-Cor, haies vers la Roussellière. — Beauchêne, bois des Turnes.

DIOSCORÉES

Tamus communis L. — Haies, bois. AC.

IRIDÉES

Iris pseudo-Acorus L. — Eaux peu profondes. C.

AMARYLLIDÉES.

Galanthus nivalis L. — Bois, haies. RR.
Baillou ; bois des Fourneaux (abondant) ; haies d'un champ situé sur la gauche du chemin de Souday à la hauteur de la Gaulerie.
Souvent cultivé dans les jardins d'où il s'échappe quelquefois, mais très probablement spontané aux deux localités indiquées.

Narcissus pseudo-Narcissus L. — Prés, bois. RR.
Bois sur le bord du chemin de Mondoubleau à St-Mars-du-Cor au tertre des Cheminées. — St-Mars-du-Cor, verger de la Bigotière (Em. Desvaux). — Choue, parc du Grand-Bouchet. Spontané ! (Mme de Terras).
Le *N. poeticus* L. est très abondant à Beauchêne, dans un pré voisin de la ferme de Mortiers.

ORCHIDÉES

Spiranthes æstivalis Rich. — Lieux marécageux. R.
Sargé : prés à gauche du chemin, parallèle à la voie ferrée, qui conduit à la route de St Calais; prés au dessus du moulin du Marais, marais de Conival où Diard l'indique. — Rives de l'étang de Bois-Vinet,

Spiranthes autumnalis Rich. — Bords des chemins, de champs. AC.

Baillou, à la croix du Boulay. — Bords du chemin de Mondoubleau à Souday. Etc.

Epipactis latifolia All. var. *viridiflora* (*Ep. viridiflora* Hoffm. Reich.). — Bois frais. R.

Baillou, bois de Roclane. — Choue, bois de la Bellotière. — Souday, bois des Joncs, un seul individu dont les fleurs étaient passées. Il appartiendrait à l'*E. latifolia* type.

Plante verte ou violacée. J'ai envoyé vivantes les deux formes à M. Boreau qui pensait devoir les rapporter toutes deux à l' *Ep. violacea* Dur. Duq. « Dans ce cas, m'écrivait-il, il faudrait ne pas prendre à la lettre l'assertion qui veut que l'*Ep. violacea* ne devienne jamais verdâtre. » Il ne resterait alors, pour distinguer l'*Ep. violacea* du *viridiflora* que l'époque de la floraison, plus tardive, et les gibbosités plissées du labelle. Ce dernier caractère est assurément peu solide, il varie sur le même individu ou sur des individus d'ailleurs tout à fait semblables : tantôt les gibbosités sont fortement plissées, tantôt elles sont presque lisses. Je crois donc qu'il suffit de distinguer une seule forme ; elle se séparerait de l'*Ep. latifolia* All. principalement par ses feuilles lancéolées assez étroites qui lui donnent un aspect particulier. — Boreau, fl. centr. éd. 3, dit l'*Ep. violacea* très rare ; il n'en cite qu'une localité dans le département du Cher.

Epipactis palustris Crantz. — Prés marécageux. R.

Prés à l'ouest et au-dessous de la Maillardiere, sur la limite des communes de Cormenon et de Sargé. — Sargé ; prés au-dessus du moulin du Marais, marais de Conival (Diard. cat.). — St-Avit ; à la Grande-Thiéraie, prés voisins et au sud de l'étang.

Neottia ovata Bluff. et Finger. — Bois frais. AC.

Mondoubleau, petit bois proche et au nord de la ferme du Tertre. — Choue, bois de Guériteau où je l'ai vu à 3 feuilles. — Baillou, parc. Etc.

Neottia Nidus-avis Rich. — Bois. R.

Choue, parc et bois des Souches. — Baillou, bois des Fourneaux et de Roclane.

Aceras hircina Lindl. — Pelouses sèches. R.

Mondoubleau, pentes à l'ouest du Tertre. — Dans la Brousse, près de Cormenon. — Cormenon, aux Rouaudières et che-

mins verts à l'ouest du bourg. — Route de Mondoubleau à St-Agil. — Environs de Sargé.

Orchis Morio L. — Prés, chaintres. CC.
Varie à fleurs blanches et à fleurs roses. On le trouve aussi à divisions latérales du périanthe un peu étalées.

Orchis Morio-mascula.—Avec les parents présumés. RR. Gazons du parc de Baillou.
Feuilles de *l'Or. Morio.* Fleurs pourpres, divisions extérieures du périanthe tout à fait étalées, labelle plié longitudinalement, éperon arrondi ou tronqué à son extrémité.

Orchis ustulata L. — Prés, gazons. AC.
Près de Mondoubleau, sur la Levée. — Baillou ; allées du bois des Fourneaux où je l'ai observé à fleurs entièrement d'un blanc jaunâtre et à odeur agréable ; prés bordant le bois de Roclane.Etc.

Orchis coriophora L. — Prés, chaintres. AR.
Baillou ; champ situé entre le bois de la Taille et le bois des Fourneaux, chaintres d'un champ situé sur le bord du chemin de Mondoubleau et en face du bois de la Talbotière. — Choue ; autour de Bouviers ; pré de l'Etang, au Grand-Bouchet ; prés du Débarras. — Environs de Beauchêne (varie à fleurs vertes, labelle ponctué de pourpre). — St-Mars-du-Cor, prés au nord du Brouillard. — Prés sur le bord de la route du Temple à Epuisay. — Sargé, prés au sud-ouest du marais de Conival (labelle largement taché de pourpre.) — Souday, autour de Glatigny. — Prés sur le bord du chemin de Souday à St-Agil. — Environs du Plessis-Dorin.

Orchis Simia Lam. — Bois. R.
Bois sur le bord du chemin de Mondoubleau à St-Mars-du-Cor, au tertre des Cheminées. — Baillou ; parc, bois de la Taille, des Fourneaux, de Roclane. — Sargé, au nord du Fief-Corbin.

Orchis pupurea Huds. — Bois, coteaux R.
Bois de la Maladrie près de Mondoubleau. — Dans la Brousse près de Cormenon. — Choue ; à l'est de la Fosse, vers la Mabillière. — Bois sur le bord du chemin de Mondoubleau à St-Mars-du-Cor, au tertre des Cheminées (varie à casque verdâtre, à labelle et à éperon entièrement blancs). — Baillou ; parc, bois des Fourneaux où je l'ai vu aussi à fleurs presque blanches.
Var. *angustata* Gr. God. Bois sur le bord du chemin de Mondoubleau à St-Mars-du-Cor.

Orchis Simio-purpurea Wedd. — Avec les parents. RR. Bois sur le bord du chemin de Mondoubleau à St-Mars-du-Cor, au tertre des Cheminées.— Baillou, bois des Fourneaux (un individu conservé en herbier offre plusieurs fleurs dont les divisions extérieures et latérales sont étalées et quelquefois prolongées en éperon court).

La plante est voisine, tantôt du *Simia* (*Or. Weddelii* Cam.), tantôt du *purpurea (Or. Franchetii* Cam.). Des intermédiaires relient ces deux formes l'une à l'autre.

Orchis mascula L. — Bords des chemins et des champs, prés. CC.

Varie très rarement à fleurs blanches.

Orchis laxiflora Lam. — Prés frais ou humides. AC.

Val de la Graine. — Choue, prés à Guériteau. — Sargé ; prés autour de la Crousille, à Conival. Etc.

Varie très rarement à fleurs roses.

Orchis Morio-laxiflora Reut. *(Or. alata* Fleury.)— Prés frais. R.

Cormenon, prés au-dessous et à l'ouest de la Maillardière. — Choue ; à Guériteau, pré de l'Etang au Grand-Bouchet. — St-Mars-du-Cor, au nord du Brouillard. — Prairie entre Baillou et Sargé. — Sargé au sud-ouest du marais de Conival. — Auprèset à l'est du petit étang de Bois-Vinet.— Le Plessis-Dorin, entre le Grand-Buisson et Olivet.

M. Gillot, Bull. Soc. bot de Fr. 2e série, tome III, p. 316, dit que, près de Givry (Saône-et-Loire), *l'Orchis alata* « se trouve en qnantité dans les prés de Corcassey où croissent pêle-mêle les *Orchis Morio, mascula, latifolia, ustulata,* mais où manque totalement *l'Or. laxiflora* dont la localité la plus voisine est distante de plus de deux kilomètres. » Mon *Orchis Morio-laxiflora* et *l'Or. alata* de M. Gillot sont-ils identiques ? Je ne sais, mais je puis affirmer que ma plante a bien les caractères d'un hybride ; elle croît en individus peu nombreux au milieu des parents supposés entre lesquels elle est exactement intermédiaire.

Orchis latifolia L. — Lieux humides ou marécageux. AC.

L'Or. incarnata. L. *(Or. divaricata* Rich.) ne me semble qu'une forme à feuilles plus étroites et dressées de *l'Or.-latifolia* (Sargé, bois au-dessus dn moulin du Marais et marais de Conival où Diard l'indique.). *L'Or. latifolia* du Perche à feuilles d'un vert jaunâtre, dresséés,assez larges ou étroites, à fleurs rouges, très rarement roses, établit bien le passage entre les deux espèces de Linné.

Orchis bifolia L. — Bois. AR.
Baillou ; bois Neuf, bois de la Talbotière (autour du pavillon). — Bois des Grands-Marchais près de St-Mars-du-Cor. — Beauchêne, bois du Coudray. — Choue ; parc des Souches, bois du Grand-Bouchet. — Sargé, à l'étang des Brosses. — Souday, bois autour de Glatigny.— St-Agil. — Le Plessis-Dorin. — St-Avit.

Orchis montana. Schmidt. — Bois. AC.

Orchis conopsea. L. — Prés frais. AC.
Prés au-dessus de la Tuilerie de Cormenon. — Choue, à Guériteau.— Sargé : à la Corneillerie; au dessous du pont de Montmarin ; prés au sud-ouest du marais de Conival. Etc.
Varie rarement à fleurs blanches.

Orchis viridis Crantz. — Prés. AR.
Prés sur le bord de la route de Mondoubleau à St-Agil, vers le Moulin-Neuf. — Baillou, prés sur le bord du ruisseau de Petite-Eau. — Choue ; vallon au-dessous de l'Epinay, à Guériteau, pré de l'Etang au Grand-Bouchet, prés du Débarras. — St-Mars-du-Cor, au dessous de Beau-Feu. — Sargé, prés au sud-ouest du marais de Conival.— Souday ; val du Coitron au-dessous du Patouilla, prés au bord du ruisseau de la Grande-Vallée. — Le Plessis-Dorin, autour d'Olivet. — St-Avit, à la Grande-Thiéraie.

Ophrys aranifera Huds.— Gazons secs. R.
Baillou ; parc, bois des Fourneaux (au-dessus de la grotte). — Choue ; à l'est de la Fosse vers la Mabillière.

Ophrys apifera Huds. — Pelouses. AR.
Mondoubleau : côteau de la Bonde ; pentes au sud-ouest du Tertre (belle localité). — Cormenon, à la Borde-Solier et au Four-à-chaux. — Choue, parc des Grandes-Berruères. — Baillou : jardin du presbytère ; haies au nord du potager (Pilon).— Souday, parc de Glatigny.— Le Plessis-Dorin, prés entre le Grand-Buisson et Olivet. — St Avit, autour de la Grande-Thiéraie.

JUNCAGINÉES

Triglochin palustre L. — Prairies marécageuses. R.
Prés au-dessous de la Vigne, près de Mondoubleau. — Choue : à Guériteau ; prés au-dessous de la Couvardière

(Dr Rendu). — Souday, entre la route de Montmirail et le moulin de Glatigny. — Sargé ; à l'Aunaie, près de Cour-d'Etain, au-dessus du moulin du Marais, marais de Cornival. — St Avit, prés au nord de l'étang de Bois-Vinet.

POTAMÉES

Potamogeton natans L. — Eaux paisibles. AC.

Potamogeton rufescens Schrad. — Rivières. RR.
Sargé, au pont sur la Graine.

Potamogeton gramineus L. — Etangs. RR.
Etang de Bois-Vinet.
a. *gramineus*. — Feuilles toutes submergées, étroites, ou les supérieures flottantes à limbe ovale plus ou moins élargi.
b. *Zizü* Koch. — Plante plus robuste ; feuilles larges, épis assez gros.

Potamogeton lucens L. — Etangs. RR.
Etang de Bois-Vinet.

Potamogeton perfoliatus L. — Rivières. R.
Dans la Braye.

Potamogeton crispus L. — Mares, ruisseaux. AC.

Potamogeton pusillus L.— Eaux vives ou dormantes. AR.
Dans la Graine. — Fossés près de Sargé.
Des spécimens à feuilles un peu élargies, recoltés dans la Graine au-dessus de Sargé, et envoyés à M. Boreau ont été rapportés par lui au *P. Berchtoldi* Fieb. (*P. pusillus* var. *major* Fr. Koch.).

Potamogeton trichoides Cham. — Mares. RR.
Choue, mare du Tronchet (Mme de Terras).

Potamogeton pectinatus L. — Etangs. RR.
Etang de Bois-Vinet.

Potamogeton densus L. — Ruisseaux, fossés. AC.

Zannichellia dentata Willd. — Eaux tranquilles; ruisseaux, mares. RR.

Cormenon, au gué des Planches (les tiges sont entièrement radicantes comme dans *Z. tenuis* Reut. Gr. fl. jur. 802.) — St Avit; au nord de l'étang de Bois-Vinet, dans une petite mare.

LEMNACÉES

Lemna trisulca L. — Petits ruisseaux. RR.
Mondoubleau, ruisseau dans le Pré-Barré.

Lemna minor L. — Mares, fossés. C.

Lemna polyrhiza L. — Mares, fossés. RR.
Environs de Mondoubleau (Em. Desvaux sec. Franch. fl. L.-et-Ch, 621.). — Je ne l'ai pas observé.

AROIDÉES

Arum maculatum L. — Lieux frais; bois, haies. C.
Plante très variable. Les feuilles à lobes plus ou moins divariqués, maculées de noir ou uniformément vertes (var. *immaculatum*), sont luisantes ou mates en dessus et en dessous; la spathe est tachée ou non de brun violacé; le spadice beaucoup plus court que la spathe ou égal à la moitié de sa longueur; la massue, violette plus ou moins foncée, grise, ou jaune comme dans *Ar. Italicum* Mill. est plus courte ou plus longue que la partie nue de son support.

TYPHACÉES

Typha latifolia L. — Rivières, étangs. AR.
Dans la Braye. — St. Avit, étang de la Grande-Thiéraie.

Typha angustifolia L. — Eaux tranquilles. RR.
Etang de Bois-Vinet.

Sparganium ramosum Huds. — Eaux tranquilles. AC.

Sparganium simplex Huds. — Eaux tranquilles. AR.
A l'abreuvoir du Foulon, près de Mondoubleau. — Dans

la Graine au-dessus de Cormenon. — Choue : ruisseau du Parc, au nord-ouest de la Bellotière ; mare à l'est des Aulneaux. — Sargé ; val de la Braye et à l'étang des Brosses.— Souday, au pont du Patouilla. — Etang de Bois-Vinet.

JONCÉES

Juncus conglomeratus L. — Lieux humides ; bords des chemins, des champs. C.

Juncus effusus L. — Lieux humides, bords des chemins des champs. C.
Coss. et Germ. fl. Par. ed. 2, considèrent, avec raison peut-être, le *J. effusus* et le *J. conglomeratus* comme deux formes d'un même type.

Juncus glaucus Ehrh. — Lieux frais ; bords des chemins, des champs. CC.

Juncus pygmæus Thuill. — Bords des étangs. RR.
Petit étang de Bois-Vinet.

Juncus supinus Mœnch. — Mares, lieux inondés. R.
Cormenon, mare à l'est des Rouaudières et voisine des pins. — Vieux chemin de Mondoubleau à Rahay.— Baillou, mare de la Gaulerie.— Sargé ; près des Fosses, trous à terre argileuse. — Bords de l'étang de Bois-Vinet. — Tiges couchées-radicantes (*J fluitans* Lam.) : Souday, près de Monidée. — Forêt de Montmirail.
Etamines en nombre variable ; 3, 4, 5, 6, sur le même individu.

Juncus lamprocarpus Ehrh. — Lieux humides ; fossés, bords des mares. C.

Juncus silvaticus Reich. — Prairies humides. C.

Juncus obtusiflorus Ehrh. — Prairies marécageuses. R.
Sargé ; prés au-dessus du moulin du Marais, marais de Conival.

Juncus compressus Jacq. — Lieux humides ; bords des chemins, des champs. AR.

Près de Cormenon, au gué des Planches. — Choue ; bords d'un chemin près et à l'est du Moulin-Neuf , parc du Grand-Bouchet. — Bords de la route de Mondoubleau à St Agil. — Pré sur le bord du chemin de Baillou à Sargé, vers l'Espérance.— Environs de Sargé.— Sur la limite des communes de Souday et d'Oigny, chemin qui des Gillardières descend à la Graine.

Juncus Tenageia L. fil. — Lieux humides ; bords des chemins, des étangs. AR.

Baillou ; à la croix du Boulay, broussailles sur le bord du chemin de Mondoubleau, fossés du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Chemin vert près des Gandonnières, non loin de Cormenon. — Vieux chemin de Cormenon à Sargé. — Bois des Grands-Marchais, près de St Mars-du-Cor. — Choue, autour du Grand-Bouchet. — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Juncus bufonius L. — Lieux frais ; bords des chemins, champs. CC.

Luzula pilosa Willd. — Bois. AR.

Près de Cormenon, broussailles au bord du ruisseau du Parc. — Choue ; bois de la Bellotière, bois d'Assise. — St-Mars du-Cor ; bois près de la Botanderie, bois situé au nord-ouest des Châtaigniers (Abbé Segret). — Bois des Grands-Marchais, près de St-Mars-du-Cor. — Sargé, bois près de la Challerie. — Souday ; bords du ruisseau de la Grande-Vallée, bois des Bouleaux, bois des Joncs.— Grands Bois de St-Agil. — Forêt de Montmirail où il est abondant.

Luzula Forsteri DC. — Bois. C.

Luzula campestris DC. — Gazons, prés. CC.

J'ai noté que dans *L. campestris* la capsule, un peu atténuée au sommet, était moins arrondie que dans *L. multiflora*.

Luzula multiflora Lej. — Bois, prés. AC.

Bois du Tertre, près de Mondoubleau. — Baillou ; bois Néuf, bois de Roclane et de la Talbotière. — Sargé, bois des Galouries. — Forêt de Montmirail. Etc.

La forme *congesta* (*L. congesta Lej.*), à Sargé, prés à la Crousille, et dans la forêt de Montmirail.

CYPÉRACÉES

Cyperus longus L. — Bords des rivières, des ruisseaux. R.
Baillou, bords de la Braye — Souday ; à Tertre-Rouge, pré marécageux au-dessus du bois de Joncs.

Cyperus fuscus L.— Lieux humides; gazons, fossés. AR.
Cormenon, au gué des Planches. — Choue ; bords du chemin qui de Monvalet conduit à Guériteau, bords du ruisseau du Parc au nord-ouest de la Bellotière, près des Grandes-Pierres. — Baillou, au pont sur la Braye. — Mare sur le bord de la route de Mondoubleau à Sargé près de la borne 42. — Sargé; à l'Aunaie, marais de Conival. — Souday; bords du Coitron, à Nouvet; au gué de la Cour; à Tertre Rouge : chemin de Vibraye près le bois des Joncs et pré marécageux au-dessus du même bois. — St-Avit, prés au au nord de l'étang de Bois-Vinet.

Cyperus flavescens L. — Voisinage des eaux. AR.
Cormenon, au gué des Planches. — Baillou, au pont sur la Braye. — Sargé; à l'Aunaie, sablière de Montmarin, prés au-dessus du moulin du Marais. — Souday; au gué de Nouvet, au pont du Patouilla, abonde au gué de la Cour; à Tertre Rouge, pré marécageux au-dessus du bois des Joncs. — Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Schœnus nigricans L. — Prairies marécageuses. RR.
Sargé, abonde au marais de Conival où Diard l'indique.

Eriophorum angustilolium Roth.— Prés tourbeux. AC.
Je possède en herbier la forme à pédoncules des épillets très courts (*Er. Vaillantii* Poit. et Turp.), récoltée par Diard à Sargé, marais de Conival.

Eriophorum latifolium Hoppe. — Prés tourbeux. Moins répandu que le précédent.
Prés au-dessus du pont d'Oisnel, non loin de Mondoubleau. — Cormenon, au-dessus de la Tuilerie. — Souday, val du Coitron. Etc.

Scirpus silvaticus L. — Lieux humides. AC.

Scirpus compressus Pers. — Lieux marécageux. R.
Sargé : à la fontaine de Vauplateau (Franchet); marais de Conival.

Scirpus lacustris L. — Eaux peu profondes.
a. *lacustris (Sc. lacustris* L. Bor. fl. centr. éd. 3). AR.
C. à Baillou, dans la Braye, et à l'étang de Bois-Vinet.
b. *Tabernæmontani (Sc. Tabernæmontani* Gmel. Bor. fl. centr. éd. 3)
J'en possède un spécimen provenant de Sargé, marais de Conival, et probablement récolté par Diard.

Scirpus setaceus L. — Gazons humides. AR.
Chemin vert qui conduit de la Maladrie aux Gandonnières, près de Cormenon.— Baillou ; à la croix du Boulay et broussailles au bord du chemin de Mondoubleau. — Fossés du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay. — Cormenon aux Rouaudières. — Choue; prés à Guériteau, bords du ruisseau du Parc au nord-ouest de la Bellotière. — Sargé, près des Fosses. – Souday : au pont du Patouilla, près de Monidée, environs de la Cour, bords du chemin de Valennes. — Chemin de St-Agil à la Fontenelle. — Bords de l'étang de Bois-Vinet et prés au nord du même étang.

Scirpus fluitans L. — Mares. R.
Baillou à la croix du Boulay. — Choue, flaques d'eau sur le bord du chemin vert de Mondoubleau à St Agil vers le Aulneaux. — St Mars-du-Cor ; prés marécageux sur le bor de la route de Mondoubleau à la Chapelle-Vicomtesse vers le Pressoir.
Dans le genre *Scirpus* les deux écailles inférieures de chaque épillet sont habituellement stériles ; elles étaient florifères sur les spécimens récoltés à St-Mars-du-Cor, vers le Pressoir.

Scirpus pauciflorus Lightf. — Prairies tourbeuses. RR.
Sargé, marais de Conival (Diard. cat. St Cal.) — Je l'y ai plusieurs fois et vainement cherché.

Heleocharis palustris R. Br. — Lieux marécageux ou inondés. C.

Heleocharis uniglumis Koch. — Prairies marécageuses. RR.
Diard, cat. St-Cal., l'indique à Sargé, marais de Conival, où je l'ai retrouvé.

Heleocharis multicaulis Dietr. — Lieux humides, marécageux. RR.
Bords de l'étang de Bois-Vinet.

Heleocharis ovata R. Br. — Bords des étangs. RR.
Bords de l'étang de Bois-Vinet. — Cette espèce disparaît quelquefois pendant plusieurs années pour reparaître ensuite.

Heleocharis acicularis R. Br. — Bords des eaux. RR.
Bord du petit étang de Bois-Vinet.

Carex pulicaris L. — Prairies tourbeuses. AR.
Cormenon, prés au bord du ruisseau de la Tuilerie. — St-Mars-du-Cor, prés marécageux vers le Brouillard (abondant). — Choue, à la Combraise. — Sargé ; au-dessous du bourg, à la Fontaine, autour de la Crousille. — Souday : bois de Glatigny (bords du ruisseau) ; prés au bord du ruisseau de la Grande-Vallée ; à Tertre-Rouge, à Chalopin. — St-Avit, à la Grande-Thiéraie.

Carex disticha Huds. — Prés humides, marécageux. AC.
Val de la Graine (Mondoubleau, Pré-Barré). — Val du ruisseau du Parc. — Choue, val du ruisseau de Guériteau. Etc.

Carex vulpina L. — Lieux humides. AC.
Val du ruisseau du Parc au-dessus du pont d'Oisnel, non loin de Mondoubleau. — Baillou, bords du ruisseau de Petite-Eau. — A l'extrémité est des Grands-Bois de St-Agil (abondant). Etc.

Carex muricata L. — Bois, gazons. AC.

Carex divulsa Good. — Bois et gazons secs. AC.

Carex paniculata L. — Prés et bois marécageux. AR.
Au-dessus du pont d'Oisnel, près de Mondoubleau, où je l'ai observé avec des épillets presque entièrement mâles. — Fontaine près des Virliblés, non loin de Cormenon. — Cormenon, prés au-dessus de la Tuilerie. — Choue, bords de la Graine au-dessous de Monvalet. — Baillou, près du moulin de Frécul. — Sargé ; prés au-dessous du pont de Montmarin, marais de Conival, bords du ruisseau du Marais, autour de la Crousille. — Souday : prés voisins de Marigny ; val du Coitron au-dessus de Chalopin.— Le Plessis-Dorin, entre le Grand-Buisson et Olivet.

Carex teretiuscula Good. — Prés tourbeux. RR.
Baillou, au-dessus du moulin de Frécul. — Sargé ; prés à Cour-d'Etain et au sud-ouest du marais de Conival.

Carex leporina L. — Pelouses humides. AC.

Cormenon, autour de l'étang des Rouaudières. — Fossés du chemin de Mondoublean à Souday. — Sargé, au bas de la bruyère du Chêne-la-Bosse. Etc.

Carex echinata Murr. — Prés marécageux. AC.
Cormenon, bords du ruisseau de la Tuilerie. — Choue; val de la Graine, prés à Guériteau. Etc.

Carex remota L. — Bords des eaux. AC.
Val de la Graine, à Mondoubleau, à Choue. — Cormenon; bois au-dessus de la Tuilerie, à l'étang des Rouaudières. — Baillou, bords du ruisseau de Petite-Eau. Etc.

Carex vulgaris Fr. — Prés marécageux. AR.
Prés sur le bord de la route de Mondoubleau à St-Agil, vers la borne 486. — Pré sur la droite du chemin de Mondoubleau à St-Mars-du-Cor au bas du tertre des Cheminées. — Cormenon, bords du ruisseau de la Tuilerie. — Choue, au-dessous du Grand-Romeau. — Sargé ; près de Cour-d'Etain, au-dessous du bourg, à Montmarin, marais de Conival, prés autour de la Fontaine. — Forêt de Montmirail.
Les oreillettes de la bractée inférieure sont arrondies ou oblongues, plus ou moins brunâtres. Je l'ai vu, dans les prés au-dessus de la Tuilerie de Cormenon, avec ces mêmes oreillettes blanches.

Carex stricta Good. — Prés marécageux. R.
Au-dessus du pont d'Oisnel, près de Mondoubleau. — Choue ; entre Monvalet et le Moulin-Neuf ; au-dessous du bois de Guériteau (côté de la chapelle).— Baillou, prés à Frécul.

Carex acuta Fr. — Prés humides, bords des eaux. AR.
Val de la Graine (Mondoubleau, Pré-Barré). — Val du ruisseau du Parc au-dessus du Pont d'Oisnel, non loin de Mondoubleau. — Choue, val du ruisseau de Guériteau. — Sargé, à l'étang des Brosses. — Souday, val du Coitron.
Je l'ai observé avec des utricules fructifères disposés sur huit rangs réguliers, comme dans *C. stricta*.

Carex glauca Murr. — Pelouses, gazons. CC.

Carex strigosa Huds. — Bois marécageux. RR.
Choue ; bois de Guériteau (côté de la fontaine), dans le voisinage du ruisseau.

Carex pallescens L. — Bois, prés. AC.
Choue, val du ruisseau de Guériteau. — Baillou, bois de Roclane. Etc.

Carex panicea L. — Prairies, gazons humides. AC.
Val du ruisseau du Parc au-dessus du pont d'Oisnel, près de Mondoubleau. — Cormenon, pré voisin de l'étang des Rouaudières. — Choue, val du ruisseau de Guériteau. Etc.

Carex præcox Jacq. — Prés, pelouses. CC.
Une larve couleur de minium se développe rarement dans les utricules qui deviennent alors lagéniformes : *C. sicyocarpa* Leb. — Mondoubleau, champs autour du Tertre. — Cormenon, champs de la Borde-des-Tailles. — Grands Bois de St-Agil.

Carex tomentosa L. — Prés humides. R.
St-Mars-du-Cor, vallon au-dessous de Beau-Feu. — Val de la Graine entre Mondoubleau et Choue, à la hauteur de la Fosse. — Sargé, dans les Galouries (Franchet).

Carex pilulifera L. — Bois secs. AR.
Mondoubleau, bois du Tertre. — Cormenon, bois des Tardivières. — Baillou, futaie du parc. — Grands Bois de St-Agil. — St-Avit, autour de la Grande-Thiéraie. — Forêt de Montmirail où il est abondant.

Carex silvatica Huds. — Bois. C.

Carex flava L. — Lieux marécageux, prés, bois. AC.
a. *flava* (*C. flava* L. Gr. God.)
Observé à Sargé, marais de Conival, la forme stérile, à utricules d'un jaune vif.
b. *Œderi* (*C Œderi* Ehrh. Gr.. God.)
Choue ; flaques d'eau sur le bord du chemin vert de Mondoubleau à St-Agil vers les Aulneaux. — Rives de l'étang de Bois-Vinet. Etc.
Certains individus établissent le passage entre les deux formes du *C. flava* ; ainsi les utricules petits de la forme *Œderi* ne sont pas toujours globuleux et brusquement terminés en bec.

Carex Hornschuchiana Hoppe. — Prairies humides, tourbeuses. AC.
Cormenon, prés à l'ouest et au-dessous de la Maillardière. — Choue, à Guériteau. Etc.

Carex fulva Hoppe. — Prairies tourbeuses. RR.
Sargé, marais de Conival.
Je croirais volontiers avec M. Franchet, fl. L.-et-Ch., et pour les raisons que cet auteur invoque, que le *C. fulva* est un hybride des *C. flava* et *Hornschuchiana* au milieu desquels il croît à Conival.

Carex distans L. — Prairies humides, tourbeuses. R.
Val du ruisseau du Parc au-dessus du pont d'Oisnel, non loin de Mondoubleau. — Pré sur le bord de la route de Mondoubleau à St-Agil, voisin de la borne 486. — Choue ; au-dessous du bois de Guériteau (côté de la fontaine), bords d'un champ situé à l'ouest des Vauxlions. — St-Mars-du-Cor, vallon au-dessous de Beau-Feu. — Prés au-dessous de Sargé. — Souday, prés à l'ouest des Gillardières. — Le Plessis-Dorin, entre le Grand-Buisson et Olivet.
Le *C. distans* de Guériteau et celui du pré voisin de la borne 486 ont les ligules courtes, presque tronquées, souvent émarginées, et non oblongues allongées comme elles le sont habituellement dans cette espèce.

Carex lævigata Sm. — Bois marécageux. RR.
Forêt de Montmirail ; pente marécageuse sur la lisière méridionale, vers la Bonneterie. Abondant.

Carex pseudo-Cyperus L. — Bords des eaux. AR.
Cormenon ; étang des Rouaudières, bois du Petit-Gaulay (abondant au bord du ruisseau). — Choue, bords de la Graine au-dessus de Monvalet. — Sargé ; val de la Graine vers les Radrets et prés autour de la Crousille. — Souday ; prés voisins de Marigny et au pont du Patouilla.

Carex ampullacea Good. — Prairies marécageuses. R.
St-Mars-du-Cor ; prés sur le bord de la route de Mondoubleau à Cloyes vers le Brouillard. — Baillou, abonde dans les fossés d'un pré situé au-dessus du moulin de Frécul. — Sargé : fossés de la prairie, près de Cour-d'Etain ; prés à Montmarin, marais de Conival.

Carex vesicaria L. — Bords des eaux. AC.
Val du ruisseau du Parc au-dessus du pont d'Oisnel, non loin de Mondoubleau. — Cormenon ; petit bois au-dessus de la Tuilerie, abonde à l'étang des Rouaudières. Etc.

Carex paludosa Good. — Bords des eaux, lieux marécageux. C.
Diard, cat. St-Cal., indique à Sargé, marais de Conival, où je ne l'ai pas retrouvé, le *C. Kochiana* DC., forme du *C. paludosa* à écailles des épis femelles longuement aristées.

Carex riparia Curt. — Bords des eaux. AR.
Mondoubleau, val de la Graine (Pré-Barré).— Choue. — Prés sur le bord du chemin de Baillou à Sargé vers l'Espérance. — Sargé, val do la Braye.

Carex hirta L. — Prés, gazons. AC.
Autour de la fosse de la Bonde, près de Mondoubleau. — Cormenon ; aux Rouaudières, au Four-à-Chaux. — Souday, prés voisins de Glatigny (feuilles et gaînes presque glabres). Etc.

GRAMINÉES

Leersia oryzoides Soland. — Bords des eaux. R.
Près de Mondoubleau, au bord de la fosse de la Bonde. — Choue ; val de la Graine et bords du ruisseau du Parc au nord-ouest de la Bellotière. — Sargé ; val de la Braye (Diard).

Phalaris arundinacea L. — Bords des eaux. C.

Anthoxanthum odoratum L. — Lieux secs, prés, gazons, bois. CC.
Glumes velues : Baillou, bois. Sargé, champs sablonneux.
On l'observe avec les fleurs stériles longues à peu près deux fois comme la fleur fertile, caractère que Gr. God. fl. fr. 3, 413, réservent exclusivement à l'*Anth. Puelü* Lec. et Lam., mais auquel Lecoq et Lamotte, cat. pl. vasc. du plateau central, 385, semblent attacher beaucoup moins d'importance ; ils disent simplement que dans leur espèce la fleur fertile est plus courte que les fleurs stériles. On en peut dire autant des fleurs de l'*Anth. odoratum*. A Cormenon, sables des Rouaudières, j'ai vu celui-ci avec les arêtes remarquablement plus longues que les glumes, et c'est bien, suivant Lec. et Lam., un des caractères propres à l'espèce nouvelle. Je ne prétends point, de ce qui précède, conclure que l'*Anth. Puelü* n'est qu'une forme appauvrie, croissant dans les terrains maigres, de l'*Anth. odoratum* ; mon observation prouve seulement que les caractères sur lesquels on l'établit ne sont pas toujours heureusement choisis.

Mibora verna P. Beauv. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Sargé, sables au bas des Galouries.

Phleum pratense L. — Prés secs, pelouses sèches. CC.
On l'observe avec la souche renflée en nodosités : *P. nodosum* L. DC.

Alopecurus pratensis L. — Prés, gazons frais. AC.

Mondoubleau, Pré-Barré. — Choue ; chemin vert de Mondoubleau à St-Agil vers les Aulneaux. — Etc.

Alopecurus agrestis L. — Gazons, champs. AC.
Je l'ai vu avec la glumelle munie de quatre nervures apparentes surtout au sommet, et non énerviée comme le disent Gr. God. fl. fr.

Alopecurus geniculatus L — Lieux humides, inondés. AR.
a. *geniculatus (Al. geniculatus* L. Gr. God.)
Mondoubleau, Pré-Barré (la glumelle est très obtuse comme dans *Al. fulvus*). — Choue, bois de la Bellotière (épis aigus au sommet, glumelle très obtuse). — Vieux chemin de Cormenon à Sargé. — Sargé, grande prairie. — St-Avit, autour de la Grande-Thiéraie.
b. *fulvus (Al. fulvus* Sm. Gr. God.)
St-Mars-du-Cor, mare aux Grands-Marchais. — Choue ; mare sur le bord du chemin vert de Mondoubleau à St-Agil vers les Aulneaux. — Sargé, étang des Brosses. — Etang de Bois-Vinet.

Setaria glauca P. Beauv. — Terrains sablonneux. RR.
Baillou, sablière près du bourg. — Sargé (Franchet, fl. L.-et-Ch.).

Setaria viridis P. Beauv. — Jardins. C.

Setaria verticillata P. Beauv. — Jardins. C.

Panicum crus-galli L. — Lieux humides ou marécageux. AR.
Choue ; val de la Graine (à Monvalet), val du ruisseau du Parc au nord-ouest de la Bellotière. — Sargé, chemin qui conduit à l'Aunaie. — Potager du château de Baillou. — Souday ; val du Coitron et à Tertre-Rouge.
Epillets mutiques ou aristés. — Glumelles de la fleur fertile quelquefois à cinq nervures, et non énerviées comme le disent Gr. God. fl. fr.

Panicum sanguinale L. — Jardins. C.

Panicum glabrum Gaud. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Vieux chemin de Cormenon au Gravier. — Baillou, sablière près du bourg. — Sargé, près du Fief-Corbin.
Feuilles velues à l'entrée des gaînes inférieures.

Phragmites communis Trin. — Bords des eaux. C.

Calamagrostis epigeios Roth. — Haies, bois. AR.
Bois des Grands-Marchais, près de St-Mars-du-Cor. — Grands Bois de St-Agil. — Souday : bois entre Glatigny et la Cour ; autour de Tertre-Rouge. — Haies du chemin d'Oigny à St-Avit. — St-Avit, vallon au nord de l'étang de Bois-Vinet.

Agrostis alba L. — Prairies, gazons. CC.
a. *alba (Agr. alba* L. Gr. God.)
b. *vulgaris(Agr. vulgaris* With. Gr. God.)

Agrostis canina L. — Prés humides. R.
Baillou, carrefour de la croix du Boulay. -- Cormenon, prés aux Rouaudières. — Champ et pré sur le bord du chemin de Mondoubleau à Souday, vers Etrivet (plante glauque).— Choue, bois du Grand-Bouchet. — Sargé, bruyère du Chêne-la-Bosse.

Agrostis spica-venti L. — Moissons. C.

Gastridium lendigerum Gaud. — Gazons, champs, bois découverts. AR. — Disparaît souvent des localités où il a été observé.
Autour de Mondoubleau. — Chemin vert conduisant de la Maladrie (près Mondoubleau) au chemin de Baillou à Sargé. — Cormenon, champs autour de la Maillardière. — AC. sur la commune de Choue à l'est du bourg (Mme de Terras). — Autour de Baillou, moissons à Bois-Vert. — Souday, dans le voisinage de la Cour (fleurs aristées et fleurs mutiques sur le même individu).— Près de l'étang de Bois-Vinet.

Milium effusum L. — Bois. R.
Choue ; bois de Guériteau (côté de la fontaine), bois des Berruères. — Souday, bois des Bouleaux.

Corynephorus canescens P. Beauv. — Sables. R.
Cormenon, aux Rouaudières (abondant).— Sargé, au Fief-Corbin.

Aira caryophyllea L. — Talus des haies, gazons.
a. *caryophyllea* (*A. caryophyllea* L. Gr. God.) CC.
b. *multiculmis* (*A. multiculmis* Dumort. Gr. God.) Çà et là.
Cormenon, haies. — Sargé, chemin qui de la route de Mondoubleau conduit au Pavillon. Etc.

Aira præcox L. Terrains siliceux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières. — Baillou, bois de la Drouille. — Sargé, sables au bas des Galouries. — Allées de la forêt de Montmirail.

Deschampsia cæspitosa P. Beauv. — Lieux humides. AR.
Près de Cormenon, fossés du chemin qui conduit au Temple — Choue ; bois de la Bellotière, bords du ruisseau qui vient de l'ancien étang de la Bortroue (abondant), bois de Romeau. —Sargé, bords du chemin qui de la route de Mondoubleau conduit au moulin de Beaufray. — Souday ; autour de Glatigny et de Tertre-Rouge. — St-Agil.— Bords de l'étang de Bois-Vinet.
Diard, cat. St-Cal., ne mentionne pas cette espèce.

Deschampsia Thuillieri Gr. God. (*Aira uliginosa* Weihe.) — Lieux marécageux. RR.
Je possède un spécimen de cette plante récolté, probablement par Diard, à Sargé, mais je n'ai pu la retrouver au marais de Conival (Sargé) où ce botaniste l'indique (Cat. St-Cal.).

Deschampsia flexuosa Gris. — Bois, bruyères. C.
On rencontre quelquefois dans les moissons l'*Avena fatua* L.

Arrhenatherum elatius Mert. et Koch, var. *bulbosum* Gaud. (*Arrh. bulbosum* Presl, sec. Bor.) — Prés, pelouses. C.
Bor. fl. centr. éd. 3, distingue spécifiquement l'*Arrh. bulbosum* de l'*Arrh. elatius*. Je possède un individu ayant la racine noueuse du premier, les nœuds inférieurs de la tige glabres et les feuilles glauques en dessus du second.

Trisetum flavescens. P. Beauv. (*Avena flavescens* L.) — Prés, gazons secs. C.

Holcus lanatus. L. — Prés, bois. CC.

Holcus mollis L. — Bois, lieux incultes. AR.
Cormenon, autour des Rouaudières. — Bords du chemin de Mondoubleau à Baillou. — Baillou ; parc, bois de la Talbotière. — Choue, parc du Grand-Bouchet. — Sargé, champs autour du moulin du Gravier. — Souday ; bois des Bouleaux, sablière près de la Cour. — Près de Guette-Loup, non loin du Temple.

Catabrosa aquatica P. Beauv. — Fossés des prairies humides, marécageuses. R.
Choue ; ruisseau de Guériteau au-dessous de la fontaine du même nom. — Sargé ; grande prairie au sud du bourg, marais de Conival.

Glyceria fluitans R. Br. — Eaux tranquilles et peu profondes. C.

Glyceria aquatica Wahlberg. — Bords des rivières. RR. Sargé ; dans la Graine près du bourg.

Poa annua L. — CC. partout.

Poa nemoralis L. — Bois, broussailles. C.

Poa bulbosa L. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, sables au-dessous de la Maillardière. — Sargé, à la Ripatière.

Poa compressa L. — Lieux secs ; champs, murs. AC.
Cormenon : murs ; moissons autour des Rouaudières où il est abondant.

Poa pratensis L. — Prés, pelouses. CC.
La forme à feuilles radicales enroulées, étroites, constitue le *P. angustifolia* Sm. Bor.

Poa trivialis L. — Prés humides, bords des eaux. AC.
Bords de la fosse de la Bonde, près de Mondoubleau. — Cormenon, bords du ruisseau de la Tuilerie. — Choue, chaintres au nord-est de la Fosse où il abonde. Etc. — La glumelle inférieure est quelquefois velue au bord.

Briza media L. — Prés, pelouses. CC.

Briza minor L. — Moissons des terrains sablonneux. R.
Cormenon, moissons autour des Rouaudières. — Choue, moissons autour des Souches. — Souday, champs humides autour de la Bourrelière. — Bords du chemin de St-Avit au Plessis-Dorin (Septembre 1888. Il devait provenir des moissons voisines).

Melica uniflora Retz. — Bois. C.

Dactylis glomerata L. — Prés, pelouses. CC.

Molinia cærulea Mœnch. — Bois et prés humides ou marécageux. AC.
Broussailles au bord du chemin de Mondoubleau à Baillou. — Choue, prés à Guériteau. — Sargé, marais de Conival. — Abonde dans les Grands Bois de St-Agil. Etc.

Danthonia decumbens DC. — Gazons. AC.

Cynosurus cristatus L. — Prés, pelouses. CC.

Festuca pseudo-myuros Soy. Willm. — Terrains sablonneux murs. AC.
a. *pseudo-myuros* (*F. pseudo-myuros* Soy. Willm Gr. God.)
b. *sciuroides* (*F. sciuroides* Roth. Gr. God.).
Je l'ai trouvé à chaumes feuillés jusqu'au sommet comme dans *F. pseudo-myuros*.

Festuca ovina L. — Bords des chemins, des haies.
a. *tenuifolia* (*F. tenuifolia* Sibth. Gr. God.) C.
Dans sa *Flore jurassique*, que l'on peut considérer comme une révision partielle de la *Flore de France*, Grenier ne fait plus du *F. tenuifolia* qu'une forme mutique du *F. ovina*. Je l'ai trouvé à St-Mars-du-Cor, bois de la Galantinerie, avec des fleurs un peu aristées.
b. *duriuscula* (*F. duriuscula* L. Gr. God.). R.
Baillou, parc. — Sargé, autour de la carrière de roussard (plante glauque).

Festuca rubra L. — Lieux secs ; pelouses, gazons. C.

Festuca heterophylla Lam. — Bois. R.
Grands Bois de St Agil. — Le Plessis-Dorin, petit bois voisin du moulin de Marigny.

Festuca pratensis Huds. — Prés. AC.

Festuca gigantea Vill. — Lieux ombragés ; bois, bords des ruisseaux. R.
Choue, bois de Guériteau (côté de la fontaine) et prés au-dessous du Pontron. — Baillou : bois de Roclane (bords de l'allée du bas); bords de la Braye au moulin de Frécul. — Souday; bois autour de Tertre-Rouge, aunaie près de la ferme de Taillefer. — Oigny ; val du Coitron vers la Pilardière.

Festuca rigida Kunth. — Terrains sablonneux, murs. R.
Au pied et sur les débris de la vieille tour de Mondoubleau ; ravin au dessous et à l'ouest du Tertre près de la ville. — Choue, terrains vagues au sud-ouest de la Raluère. — Près de Baillou (Pilon).

Bromus tectorum L. — Terrains sablonneux. R.
Cormenon, sables des Rouaudières.

Bromus sterilis L. — Lieux secs et incultes ; bords des chemins, haies. CC.
Le *Br. maximus* Desf. et le *Br. arvensis* L. étaient abondants sur les talus du chemin de Mondoubleau à Baillou, à

la côte de la Maladrie en 1879. Ils avaient paru à la suite de la construction du chemin de fer. Je ne les ai pas revus depuis.

Bromus asper L. fil. — Bois, broussailles. AC.

Bromus erectus Huds. — Pelouses sèches. AC.
Abonde au pied de la vieille tour de Mondoubleau; pentes au sud-ouest du Tertre, près de la ville. — Cormenon; chaintres d'un champ situé à l'ouest de la Borde-des-Tailles (épillets glabres), au Four-à-chaux. — Baillou, prés bordant le bois de Roclane où il est velu dans toutes ses parties. — Etc.
J'ai observé une seule fois, en 1880, dans les moissons sur le bord du vieux chemin de Mondoubleau à Rahay, le *Br. secalinus* L.

Bromus racemosus L. Koch. — DC. Prés, pelouses. AC.
Près de Mondoubleau, sur la Levée.— Choue ; à Guériteau (pré voisin de la chapelle), au Grand-Bouchet — Parc de Baillou. Etc.
Nous avons la forme *racemosus* (*Br. racemosus* L.) et la forme *commutatus* (*Br. commutatus* Schrad. Koch. *Br. pratensis* Ehrh. DC.), très voisines et souvent difficiles à séparer l'une de l'autre.
Observé à Mondoubleau un *Bromus* ayant les caractères du *commutatus* et le chaume pubescent du *mollis*.

Bromus mollis Parl. — Prés, pelouses. CC.
Varie dans les lieux arides à un ou deux épillets.
Epillets pubescents, rarement glabres.
Observé à Mondoubleau un *Bromus* dont les caractères sont ceux du *mollis*, le chaume est glabre comme dans *commutatus* Schrad.

Hordeum murinum L. — Voisinage des habitations, gazons. CC.

Hordeum secalinum Schrad. — Gazons ombragés. RR.
Près de Mondoubleau, ravin bordant la côte de la Maladrie.

Agropyrum repens P. Beauv. — Jardins champs, CC.

Agropyrum caninum Rœm. et Schult.— Lieux frais, bords des ruisseaux. AR.
Val de la Graine. — Choue, bois de Guériteau. — Baillou, bords du ruisseau de Petite-Eau (Pilon). — Oigny, val du Coitron.

Brachypodium silvaticum Rœm. et Schult. — Bois, haies. AC.
Mondoubleau, haies du chemin qui conduit à l'abreuvoir de la rue Beauvais-de-St-Paul. — Futaie du parc de Baillou (Pilon). — Baillou ; bois de Roclane ; abondant près de la Tabèse. — Etc.

Brachypodium pinnatum P. Beauv. — Pelouses sèches. C.

Lolium perenne L. — Bords des chemins, champs.
a *perenne* (*L. perenne* L. Gr. God.) CC.
b. *multiflorum* (*L. multiflorum* Lam. Gr. God.) R.
Val de la Graine : autour de Mondoubleau, de Cormenon. — Baillou, parc. — Souday.

Lolium temulentum L. — Moissons. R.
Cormenon, moissons autour du bois de la Perche. — Choue, au Grand Bouchet.

Gaudinia fragilis P. Beauv. — Prés, pelouses. R.
Près de Mondoubleau, sur la Levée et dans la partie sèche des prés du Foulon. — Baillou, chemin de Sargé près du potager. — Sargé, bords du chemin qui de la Challerie conduit aux Rouaudières.

Nardus stricta L. — Prés humides, marécageux. R.
Choue ; pré du Charbon, à la Combraise. — Prés au nord des Grands-Bois de St-Agil.

FOUGÈRES

Osmunda regalis L. — Lieux marécageux, tourbeux. R.
Souday, au bas des bois de Glatigny. — St Avit, bruyère des Maisons. — Diard., cat. St-Cal., l'indique à Sargé, marais de Connival, où je l'ai vainement cherché.

Ceterach officinarum Willd — Murs. R.
Mondoubleau, murs de la cour de l'ancienne prison. — Baillou ; vieux murs près de l'église, murs du parc. — Sargé, murs de l'église.

Polypodium vulgare L. — Dans les bois, les haies, sur les têtards. C.

Aspidium aculeatum Dœll. — Bois, ravins ombragés, haies.

a. *aculeatum (Asp. aculeatum* Sw. sec. Bor. fl. centr. éd.3. *Polypodium lobatum* Huds.) AR.

Mondoubleau; haies du vieux chemin de Souday (au Pavillon). — Haies du chemin de Mondoubleau à Baillou à la côte de la Maladrie. — Choue ; au-dessus du moulin de Monvalet, ravin au bord du chemin de Mondoubleau, bois de la Raluère (abondant), haies d'un petit chemin près et au-dessus du Moulin-Neuf. — Sargé, bois sur le bord de la route qui conduit de Montmarin á Epuisay. — Souday, petit bois près et au-dessus du moulin de Marigny (Abbé Segret). — Oigny, ravin près des Gillardières. — Le Plessis-Dorin, à la Borde-Bruyère (Abbé Segret).

b. *angulare (Asp. angulare* Kit. sec. Bor. fl. centr.éd. 3.). RR.

Choue, haies du chemin qui conduit au Grand-Bouchet (carrefour à la hauteur de la Martinière).

L'*Asp. aculeatum* Sw. serait caractérisé par des frondes roides, d'un beau vert, à lobes inférieurs des segments retrécis à la base, les plus inférieurs seuls pourvus d'une oreillette ; l'*Asp. angulare* Kit. par des frondes molles, d'un vert pâle, à lobes des segments presque tous pétiolulés et munis d'une oreillette latérale. J'ai observé :

L'*Asp. angulare* avec des frondes d'un vert foncé (hors de nos limites) ;

L'*Asp. aculeatum* avec des lobes pourvus d'oreillettes ;

L'*Asp. aculeatum* avec une fronde molle, vert pâle, et quelques-uns des lobes inférieurs pourvus d'oreillettes (hors de nos limites).

Polystichum Thelypteris Roth. — Marais, fossés. R.

Choue, bords de la rivière morte au-dessous de Quincampoix. — Sargé, au-dessus du moulin du Marais et marais de Conival.

Polystichum Filix - mas. Roth. — Bois, haies. C.

Je l'ai observé, près de Mondoubleau, dans le bois de la Maladrie, avec l'indusium violacé.

Polystichum spinulosum DC.—Lieux marécageux; bois, prés, haies. R.

Petit bois au-dessus de la Tuilerie de Cormenon.— Choue, bois de Gériteau. — Prés au-dessous de Sargé. — Souday; bois de Glatigny, bois d'aunes au-dessus de Chalopin. —Forêt de Montmirail.

Cystopteris fragilis Bernh. — Haies. R.
Choue : haies du chemin qui du Grand-Bouchet conduit aux Souches, vers le Tronchet (Mme de Terras.). — Sargé, haies du chemin qui conduit de la route de Mondoubleau aux carrières de grès ferrugineux (Retrouvé sur l'indication d'Em. Desvaux).

Asplenium Filix-fœmina Bernh. — Bords des ruisseaux, ravins ombragés, lieux marécageux. AC.

Asplenium Trichomanes L. — Haies, murs, puits. C.

Asphenium Ruta-muraria L. — Murs. Çà et là.
Cormenon, murs de l'église. — Choue, fontaine de Guériteau. — Baillou, murs du parc. — Murs à Sargé.

Asplenium Adiantum-nigrum L. — Haies. AC.

Scolopendrium officinale Sm. — Bords des ruisseaux, puits. Çà et là.

Blechnum spicant Roth. — Bois humides, fontaines. R.
Choue, fontaine dans un petit bois situé à l'ouest de la Petite-Barre et parc du château des Souches. — Sargé, fontaine sur le bord du chemin qui conduit de la Challerie à la Corneillerie. — Beauchêne ; fossés d'un bois situé au sud du « fort », non loin du Pavillon. — Forêt de Montmirail où il est abondant.

Pteris aquilina L. — Bois, bruyères, pelouses, champs. C.

EQUISÉTACÉES

Equisetum arvense L. — Prés, champs. AC.
Je l'ai observé avec les rameaux inférieurs rameux.

Equisetum Telmateia Ehrh. — Lieux marécageux. R.
Sargé, fossés de la route qui conduit à Savigny (entre Montmarin et le moulin du Marais) et bords du ruisseau du Marais. — Le Plessis-Dorin, prés entre le Grand-Buisson et Olivet.

Equisetum palustre L. — Prés marécageux. C.

Equisetum limosum L. — Fossés. AC.
La forme à tiges munies de rameaux verticillés constitue l'*Eq. fluviatile* L. On la rencontre quelquefois.

RHIZOCARPÉES

Pilularia globulifera L. — Lieux inondés l'hiver. RR. **Baillou**, à la croix du Boulay.

LYCOPODIACÉES

Lycopodium clavatum L. — Bois. R.
Forêt de Montmirail : autour de la Verrerie ; bois Poulard (24 mai 1868) ; entre la route de la Bazoche-Gouet à Melleray et un bois de pins (Abbé Segret. 1890). — Observé il y a une cinquantaine d'années par M. Gautier-Lacroze, pharmacien, dans les Grands Bois de St-Agil où il a échappé à toutes mes recherches. M. Gautier-Lacroze lui-même n'a pu l'y retrouver.

FIN

ABRÉVIATIONS

CC. Très commun.
C. Commun.
AC. Assez commun.
AR. Assez rare.
R. Rare.
RR. Très rare.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES

Acer 17
Aceras 78
Achillea 42
Adoxa 37
Æthusa 34
Agrimona 27
Agropyrum 98
Agrostis 94
Aira 94
Ajuga 68
Alchemilla 27
Alismai 75
Allium 76
Alnus 74
Alopecurus 92
Alsine 11
Althæa 15
Alyssum 6
Amarantus 68
Anagallis 53
Anchusa 56
Anemone 1
Angelica 34
Anthemis 41
Anthoxanthum 92
Anthriscus 36
Antirrhinum 60
Aquilegia 4
Arabis 6
Arenaria 11
Arnoseris 45
Arrhenatherum 95
Artemisia 41
Arum 83
Asperula 39
Aspidium 100
Asplenium 101
Astragalus 21
Atriplex 69
Ballota 67
Barbarea 5
Bellis 40
Berberis 4
Betonica 67
Betula 74
Bidens 42
Blechnum 101
Borraogo 56
Brachypodium 99
Briza 96
Bromus 97
Brunella 68
Bryonia 32
Butomus 75
Calamagrostis 94
Calamintha 65
Callitriche 31
Calluna 49
Caltha 3
Campanula 48
Capsella 7
Cardamine 6
Carduus 44
Carex 88
Carlina 45
Carpinus 74
Carum 35
Castanea 73
Catabrosa 95
Centaurea 44

Centunculus............... 53
Cerastium,................ 12
Ceratophyllum 31
Ceterach 99
Chærophyllum 36
Cheiranthus............... 5
Chelidonium 4
Chenopodium 69
Chlora 55
Chondrilla 46
Chrysanthemum 41
Chrysosplenium.... 33
Cicendia 43
Cichorium................. 45
Circæa.................... 30
Cirsium................... 43
Clematis 1
Colchicum 76
Conium 36
Conopodium 36
Convallaria.............. .. 77
Convolvulus............... 55
Cornus.................... 37
Corrigiola................ 32
Corylus................... 74
Corynephorus............. 94
Cratægus.................. 27
Crepis 47
Cucubalus................. 10
Cuscuta................... 55
Cynoglossum.............. 57
Cynosurus 96
Cyperus................... 86
Cystopteris...............101
Dactylis 96
Danthonia 96
Daphne 71
Daucus 34
Deschampsia.............. 95
Dianthus.................. 11
Digitalis 62
Dipsacus.................. 40
Draba..................... 6
Drosera................... 9
Echium 56
Elatine................... 14
Endymion,.... 76
Epilobium 29
Epipactis................. 78
Equisetum 101
Erica 49
Erigeron................. 40
Eriophorum............. 86
Erodium 16
Ervum 22
Eryngium............... 36
Erythræa 54
Eufragia 63
Eupatorium............. 42
Euphorbia 72
Euphrasia 62
Evonymus 17
Fagus................... 73
Festuca 97
Ficaria..... 3
Filago;.................. 43
Fragaria 24
Fraxinus................ 54
Fumaria 5
Galanthus............... 77
Galeopsis............... 66
Galium.................. 38
Gastridium.............. 94
Gaudinia................ 99
Genista 18
Gentiana 55
Geranium 15
Geum 23
Glechoma .... i...... 65
Glyceria 95
Gnaphalium............. 42
Gypsophila 11
Hedera.................. 37
Heleocharis............. 87
Helianthemum.......... 8
Helleborus.............. 3
Helosciadium 36
Heracleum 34
Herniaria 32
Hieracium............... 47
Holcus.................. 95
Hordeum 98
Hottonia 50
Humulus 73
Hydrocotyle............ 36
Hyoscyamus 57
Hypericum.............. 16
Hypochæris............. 45
Ilex 17
Inula.................... 42
Iris 77
Isnardia 30

Isopyrum.................. 4
Jasione.................... 48
Juncus..................... 84
Juniperus.................. 75
Knautia.................... 40
Lactuca.................... 46
Lamium..................... 65
Lapsana.................... 45
Lappa...................... 45
Lathyrus................... 22
Leersia,................... 92
Lemna...................... 83
Leontodon 46
Leonurus................... 66
Lepidium 7
Ligustrum.................. 54
Limnanthemum 55
Limosella 62
Linaria.................... 60
Linum 14
Lithospermum 56
Littorella 68
Lobelia 48
Lolium..................... 99
Lonicera................... 38
Lotus 21
Luzula..................... 85
Lychnis.................... 11
Lycopodium................. 102
Lycopus 64
Lysimachia................. 53
Lythrum.................... 31
Malachium.................. 13
Malva...................... 14
Marrubium.................. 67
Matricaria 41
Medicago................... 19
Melampyrum................. 63
Melica..................... 96
Melittis 67
Mentha 64
Menyanthes................. 55
Mercurialis 72
Mespilus 27
Mibora..................... 92
Milium..................... 94
Mœnchia.................... 12
Molinia.................... 96
Monotropa.................. 50
Montia..................... 32
Muscari.................... 76
Myosotis................... 56
Myosurus................... 1
Myriophyllum.... 30
Narcissus.................. 77
Nardus..................... 99
Nasturtium................. 5
Neottia.................... 78
Nepeta..................... 65
Nuphar..................... 4
Nymphæa.................... 4
Œnanthe.................... 34
Ononis..................... 18
Onopordon.................. 43
Ophrys..................... 81
Orchis 79
Origanum................... 64
Ornithogalum............... 76
Ornithopus................. 23
Orobanche.................. 63
Osmunda.................... 99
Oxalis,.................... 17
Panicum.................... 93
Papaver.................... 4
Parietaria................. 73
Paris...................... 76
Parnassia 10
Passerina.................. 72
Pedicularis................ 63
Peplis..................... 31
Phalaris 92
Phleum 92
Phragmites 93
Phyteuma................... 48
Picris..................... 46
Pilularia.................. 102
Pimpinella 35
Pinguicula................. 50
Pirus 28
Plantago................... 68
Poa........................ 96
Polygala................... 10
Polygonatum................ 77
Polygonum 70
Polypodium................. 99
Polystichum 100
Populus 74
Portulaca 32
Potamogeton................ 82
Potentilla................. 24
Poterium................... 27
Primula.................... 50

Prunus.................... 23
Pteris.................... 101
Pulicaria.................... 42
Pulmonaria.................... 56
Quercus.................... 73
Radiola.................... 14
Ranunculus.................... 2
Raphanus.................... 5
Reseda.................... 9
Rhamnus.................... 17
Rhinanthus.................... 63
Ribes.................... 33
Robinia.................... 21
Rosa.................... 25
Rubus.................... 24
Rumex.................... 70
Ruscus.................... 77
Sagina.................... 11
Sagittaria.................... 75
Salix.................... 74
Salvia.................... 65
Sambucus.................... 37
Sanicula.................... 36
Sarothamnus.................... 18
Saxifraga.................... 33
Scabiosa.................... 40
Scandix.................... 36
Schœnus.................... 86
Scirpus.................... 86
Scleranthus.................... 32
Scolopendrium.................... 101
Scorzonera.................... 46
Scrophularia.................... 60
Scutellaria.................... 67
Sedum.................... 32
Selinum.................... 34
Senebiera.................... 7
Senecio.................... 41
Serratula.................... 45
Setaria.................... 93
Sherardia.................... 39
Silaus.................... 34
Silene.................... 10
Sinapis.................... 5
Sison.................... 35
Sisymbrium.................... 5
Sium.................... 35
Solanum.................... 57
Solidago.................... 40
Sonchus.................... 46
Sorbus.................... 28
Sparganium.................... 83
Specularia.................... 48
Spergula.................... 13
Spergularia.................... 13
Spiræa.................... 23
Spiranthes.................... 77
Stachys.................... 67
Stellaria.................... 12
Symphytum.................... 56
Tamus.................... 77
Taraxacum.................... 46
Teesdalia.................... 6
Teucrium.................... 68
Thalictrum.................... 1
Thrincia.................... 46
Thymus.................... 64
Tiliar.................... 14
Tillæa.................... 32
Torilis.................... 34
Tragopogon.................... 46
Trifolium.................... 19
Triglochin.................... 81
Trisetum.................... 95
Tussilago.................... 40
Typha.................... 83
Ulex.................... 18
Ulmus.................... 73
Urtica.................... 73
Utricularia.................... 50
Vaccinium.................... 49
Valeriana.................... 39
Valerianella.................... 39
Verbascum.................... 58
Verbena.................... 68
Veronica.................... 61
Viburnum.................... 38
Vicia.................... 21
Vinca.................... 54
Viola.................... 8
Viscum.................... 37
Zannichellia.................... 82

Paris-Auteuil. — Imp. des Apprentis-Orphelins. — Roussel, 40, r. La Fontaine